EN

Opalescence™ Boost™ 40%
Tooth Whitening System

Description:
Opalescence Boost 40% is a hydrogen peroxide, medical in-office whitening gel. The 2-barrel jet syringe ensures maximum strength for each application and precise dosing of the activator. One barrel contains 1.1% sodium fluoride and 3% potassium nitrate, along with a unique chemical activator, which is combined with a second barrel containing hydrogen peroxide. The final hydrogen peroxide concentration is 40%.
Indications for Use:
Opalescence Boost-40% whitening is for medical in-office use only. It is indicated by the dental professional for bleaching one or more teeth. Opalescence Boost in-office whitening is also used on non-vital teeth, including in-office intracoronal bleaching.
Opalescence Boost in-office whitening is an alternative, conservative treatment (compared to crowns, veneers, etc.) for bleaching dark, internally discolored teeth caused by predisposed factors such as disease, traumatic or iatrogenic injury, congenital, systemic, metabolic or pharmacological influences. These can include but are not limited to elevated bilirubin levels, tetracycline and adult minocycline stains, porphyria, erythroblastosis fetalis and high fluoride intake during tooth development.
Preliminary Procedures:
1. Clean and polish teeth approximately two weeks prior to bleaching appointment.
2. Determine and record baseline shade. Use photographs when indicated for baseline documentation.
3. Prior to mixing, bring Opalescence Boost in-office whitening to room temperature.
WARNING: Patient, dentist and assistant must wear protective eyewear and gloves when mixing and applying this product.
Directions for Use:
Mixing Opalescence Boost in-office whitening:
1. Check syringes are securely attached.
2. Depress the small clear plunger into the middle small clear syringe to rupture interthal membrane and combine bleach and activator.
3. Press the plunger of the red syringe in, pushing all contents into the clear syringe.
4. Press the plunger back and forth completely back into the syringe.
5. Thoroughly mix activator with bleaching gel, push stems back and forth continually with thumbs and mix a minimum of 50 times rapidly (25 times each side).
6. Press all material into the RED syringe.
7. Twist to separate the two syringes and securely attach the recommended tip (Black Mini™ or Black Regular™).
Isolation - OpalDam™ resin barrier (recommended isolation):
1. Place Ultradent IsoBlock™ bite block and self-supporting Opalescence OpalDam™ resin barrier (recommended).
2. Remove lower lock (cut) from OpalDam resin barrier and securely attach it (Black Mini™ tip).
3. Verify flow prior to applying intraoral.
4. Rinse and dry teeth and gingiva thoroughly.
5. Express a continuous bead of OpalDam resin barrier along the gingival margin, overlapping approximately 0.5mm onto the enamel. Begin with the first tooth and one tooth beyond the most distal tooth that is being bleached.
6. Continue building the barrier apically until it is 4-6mm high and 1.5-2.0mm thick.
7. Express resin through any open embrasures onto the lingual lesion to completely seal and secure the patient.
8. Using the mouth mirror, look up the long axis of the teeth for gaps or minute openings exposing the underlying tissue and re-apply resin.
9. Light cure 20 seconds per arch using a scanning motion. Carefully check resin cure with an instrument.
Isolation - Rubber Dam:
Apply rubber dam using ligated clamps bi-laterally and one tooth distally to the teeth to be whitened.
1. Before attaching rubber dam to the frame, apply a bead of rubber dam sealer at the gingival margin between the dam.
2. Attach dam to the frame and invert rubber dam at the gingival border. Check for optimum seal.
Applying Opalescence Boost in-office whitening:
1. Apply activator to entire surface of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Do not activate syringes.
NOTE: If resistance continues, DO NOT use that syringe and contact Ultradent Customer Service for replacement.
2. Apply a 0.5-1.0mm thick layer of gel to clean labial surface of the tooth.
3. Allow gel to remain on the teeth 20 minutes, periodically checking and re-applying areas that have thinned or need replenishing.
4. Suction gel from teeth using the Luer Vac and SST™ (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel spillage, do not use water suction. Remove the last gel is visible, lightly rinse and air dry. Use caution not to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal.
5. Evaluate shade change.
10. Repeat steps 7-11 as needed.
11. Follow "Clean-up" instructions to remove gingival barriers.
12. Seal access with a non-eugenol and non-resin provisional restorative such as UltraTemp® Regular.
NOTES:
• If additional whitening is desired, re-schedule and repeat the Opalescence Boost in-office whitening procedure above or use Opalescence Boost home whitening.
• Whitening effect may continue for 24-48 hours following bleaching, hence a slight increase in whitening may be realized during this period.
• Over years, regression is to be expected and re-bleaching on an average 2-5 years is recommended.
Precautions and Warnings:
1. Lingual and cervical health should be confirmed before using this product.
2. Clinician, assistant, and patient must wear protective eyewear with side shields when mixing and applying Opalescence Boost in-office whitening.
3. Restorative materials will not whiten and therefore it is recommended that teeth are whitened prior to placing esthetic restorations.
4. Wait 7-10 days after bleaching procedures before placing adhesive restorations, as whitening materials interfere with bonding agents.
5. Carefully read SDS and all instructions before using.
6. Bring syringes to room temperature before mixing.
7. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. If resistance continues, DO NOT use that syringe and contact Ultradent Customer Service for replacement.
8. Use only recommended tips. Do not reuse tips to avoid cross-contamination.
9. To avoid cross-contamination, use a disposable syringe cover, re-cap, and wipe syringe with an intermediate disinfectant between uses. If these precautions are not taken, the syringes should be considered single-use.
10. Keep out of reach of children.
11. Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not whiten. Consult their primary care provider prior to treatment.
12. Wear protective gloves when handling this product.
13. Before disposing of syringes aspirate water into the syringe and express liquid down the drain. Repeat a couple of times before disposing of the syringe. Make sure any gauzes used are rinsed with water.
14. Do not use on patients with ulcerated teeth or ulcerated oral tissue.
15. When procedding a full arch, light cure the resin barrier on standard mode using a scanning motion for 20 seconds and keeping the lens approximately 1 cm from the barrier and tissue. When protecting tissue adjacent to fewer teeth, scan the barrier for approximately 3-5 seconds per tooth. With a dental instrument, carefully check resin for a full cure.
16. Bubbles can form in the margin of the OpalDam resin barrier after the application of Opalescence Boost in-office whitening gel, suction off gel, rinse and check for leakage. Dry and re-apply OpalDam resin barrier to the site.
17. Cover any sensitive areas of exposed dentin.
18. For patients with known tooth sensitivity, pre-op and post-op treatment with UltraEZ desensitizing gel. Alternatively relief is possible with toothpaste, arid/or Enamelast™ fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available.
19. Areas of hypocalcification, though not clinically visible, may exist and will whiten quicker than surrounding enamel. As patient continues to whiten, the areas will begin to blend.
20. All Ultradent syringe-delivered dental materials should never be injected.
21. Keep out of direct heat and/or sunlight.
22. Opalescence Boost (in-office whitening) should be used within 10 days of mixing. Keep refrigerated between uses.
23. Dispose of tips and syringe as described in above instruction and according to local regulations.

Opalescence™ Boost™ 40%
Zahnaufhellungssystem

Beschreibung:
Opalescence Boost 40 % ist ein Zahnaufhellungsgel für die Zahnarztpraxis Praxis mit 40 % Wasserstoffperoxid. Die Doppelzylinder-Jet-Mix-Injektionssprütze gewährleistet über den Auslöser bei jeder Anwendung maximale Stärke und die präzise Dosierung. Ein Zylinder enthält 1,1 % Natriumfluorid und 3 % Kaliumnitrat. Er wird mit einem einzigartigen chemischen Aktivator kombiniert, der sich in einem zweiten Zylinder befindet und der Wasserstoffperoxid enthält. Der abschließende Wasserstoffperoxidgehalt beträgt 40 %.
Gebrauchsinformation:
Opalescence Boost 40 % Zahnaufhellung ist nur für den Gebrauch in der zahnmedizinischen Praxis vorgesehen. Es wird vom Zahnarzt zur Zahnaufhellung von ein oder mehreren Zähnen verwendet. Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis wird auch verwendet bei devitalen Zähnen, unter Berücksichtigung von einer intrakoronalen Zahnaufhellung in der Praxis.
Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis ist eine alternative, konservative Behandlung (im Vergleich zu Kronen, Verblendungen, usw.) zur Zahnaufhellung von dunklen, innerlich verfärbten Zähnen, die durch prädisponierende Faktoren wie z. B. durch krankhafte Einwirkungen oder iatrogenische Verletzung, kongenitale, systemische, metabolische oder pharmakologische Einwirkungen verursacht wurden. Dazu gehören unter anderem ein erhöhter Bilirubinspiegel, Tetracyclin- und Minocyclin-Flecken von Erwachsenen, Porphyrie, Erythroblastose Fetalis und hohe Aufnahme von Fluorid während der entwickelnden Zahnentwicklung.
Vorbereitende Maßnahmen:
1. Reinigen und Polieren der Zähne circa zwei Wochen vor dem Termin der Bleichbehandlung.
2. Grundfarbton bestimmen und aufzeichnen. Soweit möglich, Fotos zur Dokumentierung des Ausgangswertes verwenden.
3. Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis vor dem Mischen auf Raumtemperatur bringen.
4. WARNUNG: Patient, Behandler und Assistent müssen während des Mischvorgangs und Einsatzes dieses Produktes Schutzbrillen und Handschuhe tragen.
Gebrauchsanweisung:
Mischen von Opalescence Boost Zahnaufhellung für Praxis:
1. Überprüfen, dass die Spritze sicher befestigt sind.
2. Den kleinen transparenten Kolben in die mittlere kleine durchsichtige Spritze drücken, um die interne Membrane zu brechen und um die Zahnaufhellung mit dem und Aktivator zu kombinieren.
3. Den Kolben der roten Spritze drücken und den ganzen Inhalt in die durchsichtige Spritze drücken.
4. Den durchsichtigen Kolben vollständig zurück in die rote Spritze drücken.
5. Zur sorgfältigen Mischung des Aktivators mit dem Zahnaufhellungsgel die Schäfte mit den Daumen ständig vorwärts und rückwärts drücken und das Minimum 50-mal mit schnell mischen (25-mal für jede Seite).
6. Das gesamte gemischte Gel in die ROTE Spritze drücken.
7. Die zwei Spritze drehen, um sie zu trennen und sicherstellen, und die empfohlene Spitze (Black Mini™ Spitze) auf der roten Injektionsspritze sicher befestigen (Black Mini™ oder Black Regular™).
Isolation - OpalDam™ Kunststoff (empfohlene Isolierung)
1. Ultradent IsoBlock™-Beißblock und selbstragende Opalescence / Wangenhalter platzieren.
2. Luer-Lock-Kappe von der OpalDam-Kunststoff entfernen und eine Black Mini™ Spitze sicher anbringen.
3. Durchfluss vor der intraoralen Anwendung überprüfen.
4. Zähne und Zahnfleisch sorgfältig spülen und trocknen.
5. Eine durchgehende Barriere aus OpalDam-Kunststoff entlang des gingivalen Rands mit einer Überlappung von circa 0,5 mm zum Zahnschmelz aufragen. Die Barriere jeweils einen Zahn weiter distal aufragen, als aufgehellt werden soll.
6. Den Aufbau der Barriere weiterhin apikal fortsetzen, bis eine 4-6 mm hoch und 1,5-2,0 mm breit ist.
7. Kunststoff durch alle offenen Zahnzwischenräume auf das linguale Gewebe herausdrücken, um die exponierte Zahnwurzelversiegelung vollständig aus der koronalen Pulpenkammer und bis zu 2-3 mm unterhalb der gesundheitlichen Gingiva einformen. Einen 2 mm dicken konvexen/ovalen Glasionomer oder einen mit Kunststoff modifizierten Glasionomer wie z. B. UltraChem™ einsetzen, um den endodontisch behandelten Kanal abzudichten.
2. Die Arbeitsungen 1-6 in „Mischung" oben befüllen.
3. Die Black mini-Spitze anbringen und den Durchfluss vor der intraoralen Anwendung überprüfen.
4. Die Arbeitsungen „Bottom" (Mischung), um sowohl die labiale als auch die linguale Seite des Zahns zu isolieren.
5. In die Zugangsöffnung, die labiale und bei Bedarf die linguale Seite des Zahns hinzufügen.
6. Das Gel 20 Minuten lang im Zahn verbleiben lassen.
7. Absaugung des Gels aus der Zugangsöffnung und dem Zahn unter Verwendung der Luer Vac und SST™ (Surgical Suction Tip) oder eine chirurgische Absaugspitze. Verwenden Sie kein Wasser, um Gelspritzer während des Absaugens zu vermeiden.
8. Wenn kein Gel mehr sichtbar ist, leicht spülen und luftTrocknen lassen. Sicher stellen, dass man, die isolierende Barriere oder den Kofferdamdichtung nicht zu lösen.
9. Zahnaufhellungsergebnis bewerten.
10. Bei Bedarf Schritte 7-11 wiederholen.
11. Anleitung „Reinigung" zum Entfernen der gingivalen Barrieren befolgen.
12. Zugang mit einem eugenolfreien und harzfreien provisorischen Restaurativ abdichten, wie z. B. mit UltraTemp® Regular.
HINWEISE:
• Falls eine weitere Zahnaufhellung gewünscht wird, das Zahnaufhellungsverfahren Opalescence Boost für die Praxis und wiederholen oder Opalescence Boost Zahn-Zahnaufhellungssystem.
• Die Wirkung der Zahnaufhellung kann nach der Zahnaufhellung noch 24-48 Stunden lang fortsetzen, daher kann in diesem Zeitraum eine leichte Erhöhung der Aufhellung verwirklicht werden.
• In Laufe der Jahre wird eine Rückbildung erwartet und es wird alle 3 bis 5 Jahre im Durchschnitt eine erneute Zahnaufhellung empfohlen.
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
1. Die gingivale und orale Gesundheit muss bestätigt werden, bevor man das Produkt verwendet wird.
2. Behandler, Assistent und Patient müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz während des Mischvorgangs und dem Einsatz von Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis tragen.
3. Restaurative Materialien lassen sich nicht aufhellen. Deshalb wird empfohlen, dass die Zähne vor dem Einsatz ästhetischer Restaurationen geweißt werden.
4. Nach dem Zahnaufhellungsverfahren 7-10 Tage warten, bis Restaurationen mit Klebstoff angebracht werden, da Zahnaufhellungsmaterialien die Haftmittel beeinträchtigen.
5. Sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter (im Vergleich zu Verbrauchsgütern, usw.) zur Zahnaufhellung von dunklen, innerlich verfärbten Zähnen, die durch prädisponierende Faktoren wie z. B. durch krankhafte Einwirkungen oder iatrogenische Verletzung, kongenitale, systemische, metabolische oder pharmakologische Einwirkungen verursacht wurden. Dazu gehören unter anderem ein erhöhter Bilirubinspiegel, Tetracyclin- und Minocyclin-Flecken von Erwachsenen, Porphyrie, Erythroblastose Fetalis und hohe Aufnahme von Fluorid während der entwickelnden Zahnentwicklung.
Vorbereitende Maßnahmen:
1. Reinigen und Polieren der Zähne circa zwei Wochen vor dem Termin der Bleichbehandlung.
2. Grundfarbton bestimmen und aufzeichnen. Soweit möglich, Fotos zur Dokumentierung des Ausgangswertes verwenden.
3. Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis vor dem Mischen auf Raumtemperatur bringen.
4. WARNUNG: Patient, Behandler und Assistent müssen während des Mischvorgangs und Einsatzes dieses Produktes Schutzbrillen und Handschuhe tragen.
Gebrauchsanweisung:
Mischen von Opalescence Boost Zahnaufhellung für Praxis:
1. Überprüfen, dass die Spritze sicher befestigt sind.
2. Den kleinen transparenten Kolben in die mittlere kleine durchsichtige Spritze drücken, um die interne Membrane zu brechen und um die Zahnaufhellung mit dem und Aktivator zu kombinieren.
3. Den Kolben der roten Spritze drücken und den ganzen Inhalt in die durchsichtige Spritze drücken.
4. Den durchsichtigen Kolben vollständig zurück in die rote Spritze drücken.
5. Zur sorgfältigen Mischung des Aktivators mit dem Zahnaufhellungsgel die Schäfte mit den Daumen ständig vorwärts und rückwärts drücken und das Minimum 50-mal mit schnell mischen (25-mal für jede Seite).
6. Das gesamte gemischte Gel in die ROTE Spritze drücken.
7. Die zwei Spritze drehen, um sie zu trennen und sicherstellen, und die empfohlene Spitze (Black Mini™ Spitze) auf der roten Injektionsspritze sicher befestigen (Black Mini™ oder Black Regular™).
Isolation - OpalDam™ Kunststoff (empfohlene Isolierung)
1. Ultradent IsoBlock™-Beißblock und selbstragende Lippen- / Wangenhalter platzieren.
2. Luer-Lock-Kappe von der OpalDam-Kunststoff entfernen und eine Black Mini™ Spitze sicher anbringen.
3. Durchfluss vor der intraoralen Anwendung überprüfen.
4. Zähne und Zahnfleisch sorgfältig spülen und trocknen.
5. Eine durchgehende Barriere aus OpalDam-Kunststoff entlang des gingivalen Rands mit einer Überlappung von circa 0,5 mm zum Zahnschmelz aufragen. Die Barriere jeweils einen Zahn weiter distal aufragen, als aufgehellt werden soll.
6. Den Aufbau der Barriere weiterhin apikal fortsetzen, bis eine 4-6 mm hoch und 1,5-2,0 mm breit ist.
7. Kunststoff durch alle offenen Zahnzwischenräume auf das linguale Gewebe herausdrücken, um die exponierte Zahnwurzelversiegelung vollständig aus der koronalen Pulpenkammer und bis zu 2-3 mm unterhalb der gesundheitlichen Gingiva einformen. Einen 2 mm dicken konvexen/ovalen Glasionomer oder einen mit Kunststoff modifizierten Glasionomer wie z. B. UltraChem™ einsetzen, um den endodontisch behandelten Kanal abzudichten.
2. Die Arbeitsungen 1-6 in „Mischung" oben befüllen.
3. Die Black mini-Spitze anbringen und den Durchfluss vor der intraoralen Anwendung überprüfen.
4. Die Arbeitsungen „Bottom" (Mischung), um sowohl die labiale als auch die linguale Seite des Zahns zu isolieren.
5. In die Zugangsöffnung, die labiale und bei Bedarf die linguale Seite des Zahns hinzufügen.
6. Das Gel 20 Minuten lang im Zahn verbleiben lassen.
7. Absaugung des Gels aus der Zugangsöffnung und dem Zahn unter Verwendung der Luer Vac und SST™ (Surgical Suction Tip) oder eine chirurgische Absaugspitze. Verwenden Sie kein Wasser, um Gelspritzer während des Absaugens zu vermeiden.
8. Wenn kein Gel mehr sichtbar ist, leicht spülen und luftTrocknen lassen. Sicher stellen, dass man, die isolierende Barriere oder den Kofferdamdichtung nicht zu lösen.
9. Zahnaufhellungsergebnis bewerten.
10. Bei Bedarf Schritte 7-11 wiederholen.
11. Anleitung „Reinigung" zum Entfernen der gingivalen Barrieren befolgen.
12. Zugang mit einem eugenolfreien und harzfreien provisorischen Restaurativ abdichten, wie z. B. mit UltraTemp® Regular.
HINWEISE:
• Falls eine weitere Zahnaufhellung gewünscht wird, das Zahnaufhellungsverfahren Opalescence Boost für die Praxis und wiederholen oder Opalescence Boost Zahn-Zahnaufhellungssystem.
• Die Wirkung der Zahnaufhellung kann nach der Zahnaufhellung noch 24-48 Stunden lang fortsetzen, daher kann in diesem Zeitraum eine leichte Erhöhung der Aufhellung verwirklicht werden.
• In Laufe der Jahre wird eine Rückbildung erwartet und es wird alle 3 bis 5 Jahre im Durchschnitt eine erneute Zahnaufhellung empfohlen.
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
1. Die gingivale und orale Gesundheit muss bestätigt werden, bevor man das Produkt verwendet wird.
2. Behandler, Assistent und Patient müssen Schutzbrillen mit Seitenschutz während des Mischvorgangs und dem Einsatz von Opalescence Boost Zahnaufhellung für die Praxis tragen.
3. Restaurative Materialien lassen sich nicht aufhellen. Deshalb wird empfohlen, dass die Zähne vor dem Einsatz ästhetischer Restaurationen geweißt werden.
4. Nach dem Zahnaufhellungsverfahren 7-10 Tage warten, bis Restaurationen mit Klebstoff angebracht werden, da Zahnaufhellungsmaterialien die Haftmittel beeinträchtigen.
5. Sorgfältig die Sicherheitsdatenblätter (im Vergleich zu Verbrauchsgütern, usw.) zur Zahnaufhellung von dunklen, innerlich verfärbten Zähnen, die durch prädisponierende Faktoren wie z. B. durch krankhafte Einwirkungen oder iatrogenische Verletzung, kongenitale, systemische, metabolische oder pharmakologische Einwirkungen verursacht wurden. Dazu gehören unter anderem ein erhöhter Bilirubinspiegel, Tetracyclin- und Minocyclin-Flecken von Erwachsenen, Porphyrie, Erythroblastose Fetalis und hohe Aufnahme von Fluorid während der entwickelnden Zahnentwicklung.

DE

Opalescence™ Boost™ 40%
Zahnaufhellungssystem

Description :
Opalescence Boost 40 % est un gel de blanchiment médical contenant 40 % de peroxyde d'hydrogène. La seringue mélangeuse à 2 cylindres assure une robustesse optimale suffisante lors de chaque application et un dosage précis de l'activateur. Le premier cylindre contient 1,1 % de fluorure de sodium et 3 % de nitrate de potassium ainsi qu'un activateur chimique unique combiné au peroxyde d'hydrogène situé dans le deuxième cylindre. Cette méthode permet d'obtenir une concentration finale de peroxyde d'hydrogène de 40 %.
Indications d'emploi :
Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost 40 % est exclusivement réservé à un usage médical en cabinet. Il est appliqué par le professionnel dentaire afin de blanchir une ou plusieurs dents. Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost peut également être appliqué sur les dents devitalisées, y compris en cabinet dentaire intracoronal effectué en cabinet.
Le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost constitue une méthode alternative conservatrice (par rapport aux couronnes, facettes, etc.) permettant de blanchir les dents foncées de l'intérieur, causées par un ou plusieurs facteurs de prédisposition tels que les maladies, les blessures traumatiques ou iatrogènes ainsi que les influences congénitales, systémiques, métaboliques ou pharmacologiques. Ceux-ci peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, des niveaux élevés de bilirubine, des taches de tétracycline et de minocycline chez l'adulte, une porphyrie, une érythroblastose fœtale et un apport élevé en fluor au cours du développement des dents.
Procédures préliminaires :
1. Nettoyer et polir les dents environ deux semaines avant la date de blanchiment prévue.
2. Déterminer et noter la teinte de base. Le cas échéant, prendre des photographies à des fins de documentation initiale.
3. Avant de mélanger le produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost à température ambiante.
4. AVERTISSEMENT : Le patient, le clinicien et l'assistant doivent porter des lunettes et des gants de protection lors du mélange et de l'application de ce produit.
Mélange :
Mélange du produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost :
1. Vérifier que les seringues ont été solidement vissées.
2. Appuyer sur le petit piston transparent pour finisérer dans la petite seringue transparente du milieu pour rompre la membrane interne et mélanger le gel de blanchiment et l'activateur.
3. Appuyer sur le piston de la seringue rouge pour transférer tout son contenu dans la seringue transparente.
4. Appuyer sur le piston transparent jusqu'en butée dans la seringue rouge.
5. Pour bien mélanger l'activateur et le gel de blanchiment, remuer continuellement les tiges du piston en arrière avec les pouces en effectuant au minimum 50 allers-retours rapides (25 de chaque côté).
6. Transférer l'ensemble du gel mélangé dans la seringue ROUGE.
7. Dévisser les deux seringues pour les séparer et fixer solidement l'embout recommandé (Black Mini™ sur la seringue rouge).
Isolation : digue en résine OpalDam™ (isolation recommandée) :
1. Placer le bloc d'occlusion Ultradent IsoBlock™ et les écarteurs autoportants pour lèvres et joues.
2. Retirer le capuchon Luer Lock de la digue en résine OpalDam et le fixer solidement à une Black Mini™.
3. Contrôler le débit avant l'application intraorale.
4. Rincer et sécher soigneusement les dents et les gencives.
5. Appliquer un cordon continu de digue en résine OpalDam le long de la limite gingivale, en le faisant chevaucher d'environ 0,5 mm sur l'émail. Commencer et terminer le cordon une dent après la dent à traiter la plus distale.
6. Continuer à construire la digue apicalement jusqu'à ce qu'elle mesure 4 à 6 mm de hauteur et 1,5 à 2,0 mm d'épaisseur.
7. Appliquer de la résine dans les embrasures ouvertes et sur le tissu lingual pour sceller et recouvrir entièrement les papilles exposées.
8. À l'aide du miroir buccal, inspecter l'axe des dents pour détecter les espaces ou les minuscules ouvertures susceptibles d'exposer le tissu sous-jacent et réappliquer de la résine.
9. Photopolymériser pendant 20 secondes en effectuant un mouvement de balayage. Vérifier soigneusement la durcissement de la résine à l'aide d'un instrument.
Isolation : digue en caoutchouc
1. Appliquer la digue en caoutchouc en plaçant des crampons bilatéralement et sur la dent distale à la dernière dent à blanchir.
2. Avant de fixer la digue en caoutchouc au cadre, appliquer un cordon de pâte d'obturation sur le rebord gingival situé sous la digue.
3. Fixer la digue au cadre et inverser la digue en caoutchouc sur le rebord gingival. Vérifier l'étanchéité.
Application du produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost
1. Contrôler le débit de toutes les seringues sur une quai on un bloc de mélange avant l'application intraorale. Une fois la résistance atteinte, remplacer l'embout et procéder à une nouvelle vérification. Utiliser exclusivement les embouts recommandés.
REMARQUE : Si la résistance persiste, NE PAS utiliser cette seringue et contacter le service client Ultradent pour obtenir un remplacement.
2. Appliquer une couche de gel de 0,5 à 1,0 mm d'épaisseur sur la surface vestibulaire propre de la dent.
3. Laisser le gel sur les dents pendant 20 minutes en effectuant des contrôles périodiques et en le réappliquant sur les zones amincies ou ayant besoin d'être complétées.
4. Aspirer le gel des dents à l'aide du Luer Vac et du SST™ (Surgical Suction Tip) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau durant l'aspiration du gel. Une fois le gel devenu invisible, rincer légèrement et laisser sécher à l'air. Veiller à ne pas déloger la digue en résine OpalDam ou le joint de caoutchouc.
5. Évaluer l'évolution de la teinte suite à chaque application et surveiller le parfait blanchiment des dents. En cas de sensibilité dentaire persistante, cesser d'utiliser le produit.
6. Éviter le contact du produit avec les tissus mous ou le flux salivaire. En cas d'irritation chimique due au contact des tissus mous, interrompre le traitement et rincer abondamment. Si nécessaire, appliquer immédiatement le gel sur les tissus à l'aide d'une gaze humide puis rincer abondamment. Le gel de blanchiment peut être irritant pour les tissus mous et provoquer des douleurs et des éclaboussures. Ne pas laisser le produit sécher sur les tissus mous.
7. Répéter les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que la teinte souhaitée soit atteinte. Ne pas dépasser 3 applications par visite.
8. Si un blanchiment supplémentaire est jugé nécessaire et qu'aucune sensibilité significative n'a été observée, laisser le gel sur les dents pendant 20 minutes supplémentaires.
9. Si un blanchiment supplémentaire est jugé nécessaire et qu'une sensibilité significative est apparue, ne pas appliquer de gel au cours de la séance suivante. Si cette sensibilité disparaît dans les 24 heures suivant le blanchiment, c'est pourquoi une légère augmentation du blanchiment peut être observée durant cette période.
10. Répéter les étapes 7 à 11 si besoin.
11. Suivre les instructions de la section "Nettoyage" pour retirer les digues gingivales.
12. Sceller l'accès avec un produit de restauration provisoire sans eugénol ni résine tel que l'UltraTemp® Regular.
REMARQUES :
• Si un blanchiment supplémentaire est nécessaire, programmer et répéter le processus de blanchiment Opalescence Boost en cabinet ci-dessus ou employer le blanchiment Opalescence Endo.
• L'effet de blanchiment peut se poursuivre pendant 24 à 48 heures suivant le blanchiment. C'est pourquoi une légère augmentation du blanchiment peut être observée durant cette période.
• Une régression se produit habituellement au fil des ans et c'est pourquoi il est recommandé de procéder à un nouveau blanchiment sous 3 à 5 ans.
Précautions et avertissements :
1. S'assurer de la bonne santé gingivale et bucco-dentaire du patient avant d'utiliser ce produit.
2. Le clinicien, l'assistant et le patient doivent porter des lunettes de protection pourvues d'écrans latéraux lors du mélange et de l'application du produit de blanchiment en cabinet Opalescence Boost.
3. Les matériaux de restauration ne blanchissent pas. C'est pourquoi il est recommandé de blanchir les dents avant de procéder à des restaurations esthétiques.
4. Patientez 7 à 10 jours suite aux procédures de blanchiment avant de poser des matériaux adhésifs, car les matériaux de blanchiment interfèrent avec les agents de liaison.
5. Lire attentivement la fiche signalétique et toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
6. Amener les seringues à température ambiante avant de procéder au mélange.
7. Contrôler le débit de toutes les seringues avant l'application intraorale. Une fois la résistance atteinte, remplacer l'embout et procéder à une nouvelle vérification. Si la résistance persiste, NE PAS utiliser cette seringue et contacter le service client Ultradent pour obtenir un remplacement.
8. Utiliser exclusivement les embouts recommandés. Ne pas réutiliser les embouts pour éviter la contamination croisée. 9. Pour éviter la contamination croisée, utiliser un couvercle à seringue jetable, refermer la seringue et essuyer avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation. Dans le cas contraire, les seringues doivent être considérées à usage unique.
10. Tenir le produit hors de portée des enfants.
11. Les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les patients présentant de graves problèmes de santé ne doivent pas se faire blanchir les dents. Consulter leur médecin traitant avant de les traiter.
12. Porter des gants de protection lors de la manipulation de ce produit.
13. Avant d'éliminer les seringues, aspirer de l'eau dans la seringue puis évacuer le liquide dans le drain. Répéter l'opération plusieurs fois avant de jeter la seringue. Veiller à rincer les gazes à l'eau.
14. Ne pas utiliser le produit chez les patients présentant une sensibilité connue aux peroxydes, glycols, acrylates ou autres résines. En cas de réaction allergique, de dermatite ou de gêne respiratoire, cesser d'utiliser le produit et consulter un médecin.
15. Lors de la protection d'une arcade complète, photopolymériser la digue en résine en mode standard en effectuant un mouvement de balayage pendant 20 secondes en maintenant la lentille à environ 1 cm de la digue et des tissus. Lors de la protection de tissus adjacents à une quantité de dents plus réduite, balayer la digue pendant environ 3 à 5 secondes par dent. À l'aide d'un instrument dentaire, vérifier soigneusement le durcissement complet de la résine.
16. Des bulles se forment sur le rebord de la digue en résine OpalDam suite à l'application d'Opalescence Boost en cabinet, aspirer le gel, rincer et contrôler la présence de fuites. Sécher et réappliquer la digue en résine OpalDam sur le site.
17. Recouvrir les zones sensibles de la dentine exposée.
18. Pour les patients présentant une sensibilité dentaire connue, il est recommandé de procéder à un traitement préopératoire et postopératoire au gel désensibilisant UltraEZ, le dentifrice de soulagement de la sensibilité Opalescence et/ou le vernis au fluor Enamelast™. En fonction de la gravité de la sensibilité, d'autres possibilités de traitement sont disponibles.
19. Bien que parfois non cliniquement visibles, les zones d'hypocalcification présentes peuvent blanchir plus rapidement que l'émail environnant. Les zones fusionneront progressivement à la fin du blanchiment.
20. Les produits dentaires fournis dans une seringue Ultradent ne doivent pas être injectés.
21. Conserver à l'abri de la chaleur et/ou de la lumière directe du soleil.
22. Le blanchiment Opalescence Boost en cabinet doit être utilisé dans les 10 jours suivant le mélange. Conserver au réfrigérateur entre chaque utilisation.
23. Éliminer les embouts et les seringues conformément aux instructions ci-dessus et les réglementations locales.

Opalescence™ Boost™ 40%
Tandblekningssystem

Beskrivelse:
Opalescence Boost 40 % er en medicinsk blegegel med 40 % hydrogenperoxid til brug i klinikken. Jetmix-sprøjten med 2 fatninger sikrer maksimalt styrke ved hver anvendelse og at aktivatoren doseres nøjagtigt. En patron indeholder 1,1 % natriumfluorid og 3 % kaliumnitrat sammen med en unik kemisk aktivator, der er blandet med en anden patron, der indeholder hydrogenperoxid. Den endelige hydrogenperoxidkoncentration er 40 %.
Indikationer for brug:
Opalescence™ Boost™ 40 % blegemiddel er kun til brug i klinikken. Produktet anvendes af tandlægen til blegning af en eller flere tænder. Opalescence Boost blegemiddel til brug i klinikken bruges også på ikke-vitale tænder, herunder intracoronal blegning i klinikken.
Opalescence Boost Whitening til brug i klinikken er en alternativ, konservativ metode (sammenlignet med kroner, finerer etc.) til blegning af mørke, internt misfarvede tænder, forårsaget af praedisponerende faktorer, såsom sygdom, traumatisk eller iatrogen skade, kongenitale, systemisk, metabolisk eller farmakologisk påvirkning. Disse kan indbefatte, men er ikke begrænset til forhøjede bilirubinniveauer, tetracyklin og minocyclinpletter hos voksne, porfyri, fatal erytroblastose og høj fluorindtag under tandudvikling.
Forbelredende procedure:
1. Rengør og polér tænderne ca. to uger før blegningstidspunktet.
2. Bestem og registrer grundfinjenuance. Brug fotografier, når de er angivet til basislinjedokumentation.
3. Inden blanding skal Opalescence Boost blegemiddel til brug i klinikken til stuetemperatur.
4. ADVARSEL: Patienten, klinikeren og assistenten skal bære beskyttelsesbriller og hånd.Der ved blanding og påføring af dette produkt.
Brugsanvisning:
Blanding af Opalescence Boost blegemiddel til brug i klinikken:
1. Kontroller, at sprøjter er skikket fastsigtet.
2. Tryk det lille klare stempel ind i den midterste, lille, klare sprøjte for at bryde den indre membran og kombinere blegemiddel og aktivator.
3. Tryk stemplet på den røde sprøjte ind, og skub alt indhold ind i den klarsprøjte.
4. Tryk det klare stempel helt tilbage i den røde sprøjte.
5. For at blande aktivator grundigt med blegegel, skal stammerne hele tiden skubbes ud og ind med tommelfingerne og der skubdes mindst 50 gange hurtigt (25 gange for hver side).
6. Tryk alt blandet gel ind i den RØDE sprøjte. 7. Drej for at adskille de to sprøjter og fastgør den anbefalede spids (Black Mini™ spids) til den røde sprøjte.
Isolering - OpalDam™ harpiksbarriere (anbefalet isolering):
1. Placer Ultradent IsoBlock™ Bite Block og selvbærende læbe- / kindretraktorer.
2. Fjern Luer-lås-hætten fra OpalDam-harpiksbarrieren og fastgør en Black Mini™-spids.
3. Kontroller flowet inden intraoral anvendelse.
4. Skyl og tørre tænder og gummer grundigt.
5. Tryk en kontinuerlig perle OpalDam-harpiksbarriere ud langs tandkødskanten, der overlapper emaljen med ca. 0,5 mm på emaljen. Begynd og afslut perlen en tand ud over den mest distale tand, der bliver bleget.
6. Fortsæt med at bygge barrieren apisk, indtil den er 4-6 mm høj og 1,5-2,0 mm tyk.
7. Tryk harpiks ud gennem enhver åben embrasur på det lingvale væv for at sikre og fastgøre patienten.
8. Ved hjælp af mundspejlet op ad tændernes lange akse for at se, om der er mellemrum eller små åbninger, der blotlægger det underliggende væv og genpåfør resin.
9. Lyshærd 20 sekunder pr. bue med en scanning bevægelse. Kontroller forsigtigt den lyshærdede harpiks med et instrument.
Isolering – kofferdam
1. Anvend kofferdam, idet de ligerede klemmer placeres bilateralt og en tand distalt til de tænder, der skal bleges.
2. Før kofferdammen fastgøres på rammen, skal du anbringe en perle af kofferdamforsegler ved tandkødskanten langs dæmningen.
3. Fastgør kofferdammen på rammen og inverter kofferdammen ved gingivalkanten. Kontroller for optimal forsegling.
Påføring af Opalescence Boost blegemiddel til brug i klinikken
1. Kontroller flowet af alle sprøjter

Eristys - OpalDam™ hartsieste (suositeltu eristys):
1. Aseta Ultradent IsoBlock™ purentaeste ja itsetuetut huuli/poski sisäänvetäjät.
2. Poista Luer-lukon korkki OpalDam-hartsiesteestä ja kiinnitä Black Mini™ -pää tukevasti.
3. Varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
4. Huuhtele ja kuivaa hampaat ja ikenet huolellisesti.
5. Annostele katkeamaton kerros OpalDam-hartsiestettä ikenen reunaan, limittäen noin 0.5mm kiilteen päälle. Aloita ja lopeta kerros yksi hammas yli distaalisimmasta, valkaistavasta hampaasta.
6. Jatka esteen rakentamista apikaalisesti kunnes se on 4-6mm korkea ja 1.5-2.0mm paksu.
7. Paina hartsia kaikkiin avoimiin hammasväleihin kielikudoksiin tiivistääksesi ja peittääksesi paljastuneet nystyt.
8. Etsi hampaan pitkältä sivulta aukkoja tai pieniä alla olevan kudoksen paljastavia rakoja suupeiliä käyttäen ja annostele hartsi uudestaan.
9. Koveta valolla 20 sekunnin ajan kaarta kohden pyyhkäisevällä liikkeellä. Tarkista hartsin kovettuminen huolellisesti instrumentilla.

Eristys – Kumisulku (Rubber Dam)
1. Annostele kumisulku asettaen sidotut puristimet bilateraalisesti ja distaalisesti yksi hammas valkaistavasta hampaasta.
2. Annostele kerros kumisulkutiivistettä ikenen reunaan sulun alle ennen kumisulun kiinnittämistä kehykseen.
3. Kiinnitä sulku kehykseen ja käännä kumisulku ikenen rajaan. Tarkista optimaalinen tiiviste.

Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisu
1. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus harsolla tai sekoitusalustalla ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan. Käytä vain suositeltuja päitä.
HUOMAUTUS: Mikäli vastustus jatkuu, ÄLÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
2. Annostele 0.5-1.0mm paksu kerros geeliä hampaan puhtaalle, labiaaliselle pinnalle.
3. Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi, ja tarkista ja uudelleen annostele säännöllisesti alueille jotka ovat ohentuneet tai tarvitsevat täydennystä.
4. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgista imupäätä. Älä käytä vettä geeliä imettäessä välttääksesi geeliroisketta. Huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmalla kun näkyvää geeliä ei ole. Noudata varovaisuutta ettet irrota eristysestettä tai kumisulun tiivistettä.
5. Arvioi sävyn muutos jokaisen annostelun jälkeen ja seuraa potilasta yliherkkyyden ja ärsytyksen varalta. Lopeta käyttö mikäli jatkuvaa hammasyliherkkyyttä havaitaan.
6. Vältä kontaktia pehmytkudoksen tai syljen erityksen kanssa. Pyyhi geeli välittömästi kudoksesta märällä harsolla ja huuhtele alue hyvin mikäli kemiallista ärsytystä syntyy vetyperoksidigeelin päästessä kosketukseen suunsisäiseen pehmytkudokseen. Kudoksen tulisi palautua normaaliksi 20-30:n minuutin kuluessa.
7. Toista vaiheet 2-5 enintään kaksi kertaa mikäli haluttuja tuloksia ei ole saavutettu. Älä ylitä 3:a annostelua käyntikertaa kohden.
8. Varaa uusi aika mikäli vastaanotolla tehtävä valkaisu halutaan toistaa eikä merkittävää yliherkkyyttä havaittu. Toista käsittely kun yliherkkyys on laantunut mikäli yliherkkyyttä havaittiin.

Puhdistus
1. Ime geeli hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgista imupäätä, ja huuhtele sitten hammas huolellisesti ilma-/vesisuihkulla ja korkeatehoisella imulla.
2. Liu'uta pää hellävaroen OpalDam-hartsiesteen alle ja nosta pois käyttäen dentaali-instrumenttia. Tarkista ja poista kaikki interproksimaaliset jäännökset.
3. Noudata puhdistusohjeen vaihetta 1 mikäli käytät kumisulkua, poista puristimet, sulku ja kehys.
4. Poista kumisulun tiiviste lastalla, pehmeällä hammasharjalla, hammaslangalla, imulla ja vakaalla ilma-/vesisuihkulla.

HUOMAUTUKSIA:
• Valkaisua käytetään palauttamaan hampaan luonnollinen sävy vastaamaan värjäytymättömien hampaiden sävyä tai edellistä vastaavaa korjausta.
• Valkaisuvaikutus voi jatkua 24-48 tuntia valkaisun jälkeen, joten tänä aikana saattaa tapahtua pieni lisäys valkaisuun.
• Yksittäinen tai muutama hammas voidaan valkaista samojen ohjeiden mukaan ja annostelemalla valkaisuainetta vain tietyille, värjääntyneille alueille.
• Käytä kaliumnitraattituotteita kuten UltraEZ™ -siedätysgeeliä operaation jälkeiseen yliherkkyyteen välittömästi käsittelyn jälkeen ja 15-60 minuutin ajan päivässä kunnes yliherkkyys laantuu.
• Hammaskiilteen etsaaminen tai kiillottaminen prophy-tahnalla ennen mitään valkaisutoimenpidettä ei ole suositeltavaa eikä edistä valkaisuprosessia, mutta voi aiheuttaa yliherkkyyttä.

Juurihoidetut hampaat:
• Ei-elinvoimaiset hampaat voidaan valkaista sekä sisältä ulos että ulkoa sisälle valkaisunopeuden/tehokkuuden kiihdyttämiseksi.
1. Poista paikka ja juurikanavan täyttöaine kokonaisuudessaan kruunun alueelta sekä 2–3 mm terveen ienrajan alapuolelta. Täytä juurihoidettu kanava 2 mm paksuudelta tavallisella lasi-ionomeerillä tai resiinillä vahvistetulla lasi-ionomeerillä, kuten esimerkiksi UltraCem™-tuotteella.
2. Noudata sekoitusohjeita 1-6 yllä.
3. Liitä tai musta (Black) minipää ja varmista virtaus ennen suunsisäistä annostelua.
4. Seuraa eristysohjeita yllä ja eristä hampaan labiaalinen ja linguaalinen puoli.
5. Paina aukkoon labiaalinen ja halutessa linguaalinen pinta.
6. Jätä geeli hampaaseen 20:n minuutin ajaksi.
7. Ime geeli aukosta ja hampaasta käyttäen Luer Vac ja SST™ (Surgical Suction Tip) tai kirurgista imupäätä. Älä käytä vettä geeliä imettäessä välttääksesi geeliroisketta.
8. Huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmalla kun näkyvää geeliä ei ole. Noudata varovaisuutta ettet irrota eristysestettä tai kumisulun tiivistettä.
9. Arvioi sävyn muutos.
10. Toista vaiheet 7-11 tarvittaessa.
11. Noudata puhdistusohjeita poistaaksesi ienesteet.
12. Tiivistä aukko tilapäisellä eugenolia ja hartsia sisältämättömällä korjaajalla kuten UltraTemp™ Regular.

HUOMAUTUKSIA:
• Varaa uusi aika ja toista Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisutoimenpide yllä tai käytä Opalescence Endo valkaisua mikäli lisävalkaisua halutaan.
• Valkaisuvaikutus voi jatkua 24-48 tuntia valkaisun jälkeen, joten tänä aikana saattaa tapahtua pieni lisäys valkaisuun.
• Vuosien aikana on odotettavissa taantumista, ja uudelleen valkaisua suositellaan 3-5:n vuoden välein.

Varotoimet ja varoitukset
1. Ienten ja suun terveys tulisi varmistaa ennen tämän tuotteen käyttämistä.
2. Kliinikon, avustajan ja potilaan on käytettävä sivusuojallisia suojalaseja Opalescence Boost vastaanotolla tehtävää valkaisua sekoittaessa ja annosteltaessa.
3. Korjaavat materiaalit eivät valkaistu ja täten on suositeltavaa valkaista hampaat ennen esteettisten korjausten tekemistä.
4. Odota 7-10 päivää valkaisutoimenpiteiden jälkeen ennen adhesiivisia korjauksia, koska valkaisumateriaalit vaikuttavat kiinnitemateriaalien toimintaan.
5. Lue SDS ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
6. Tuo ruiskut huoneenlämpöön ennen sekoittamista.
7. Varmista kaikkien ruiskujen virtaus ennen suunsisäistä annostelua. Vaihda pää ja tarkista uudelleen mikäli vastustusta havaitaan. Mikäli vastustus jatkuu, ÄLÄ KÄYTÄ ruiskua ja ota yhteyttä Ultradentin asiakaspalveluun sen korvaamiseksi.
8. Käytä vain suositeltuja päitä. Älä uudelleen käytä päitä ristikontaminaation välttämiseksi.
9. Käytä kertakäyttöisiä ruiskusuojuksia, uudelleen sulje ja pyyhi ruisku desinfiointiaineella käyttökertojen välissä ristikontaminaation välttämiseksi. Ruiskuja tulee käsitellä kertakäyttöisinä mikäli näitä toimenpiteitä ei tehdä.
10. Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
11. Raskaana olevien tai imettävien naisten, tai potilaiden joilla on vakavia terveysongelmia, hampaita ei tulisi valkaista. Keskustele heidän ensisijaisen hoidon tarjoajansa kanssa ennen toimenpidettä.
12. Käytä suojakäsineitä tätä tuotetta käsitellessäsi.
13. Ime ruiskuun vettä ja purista neste viemäriin ennen ruiskujen hävittämistä. Toista muutaman kerran ennen ruiskun hävittämistä. Varmista että kaikki käytetyt harsot on huuhdeltu vedellä.
14. Älä käytä potilaisiin jotka ovat yliherkkiä peroksideille, glykoleille, akrylaateille tai muille hartseille. Keskustele lääkärin kanssa mikäli allerginen reaktio, ihotulehdus tai ihottumaa havaitaan.
15. Kun suojaat koko kaaren, koveta hartsieste valolla standardi-tilassa pyyhkäisevällä liikkeellä 20:n sekunnin ajan pitämällä linssi noin 1 cm:n päässä esteestä ja kudoksesta. Kun suojaat hampaiden viereistä kudosta, pyyhkäise estettä noin 3-5 sekuntia hammasta kohden. Tarkista huolellisesti että hartsi on kovettunut täysin dentaali-instrumenttia käyttämällä.
16. Ime geeli pois, huuhtele ja tarkista vuodot mikäli OpalDam-hartsiesteen reunassa on kuplia Opalescence Boost vastaanotolla tehtävän valkaisun jälkeen. Kuivaa alue ja uudelleen annostele OpalDam-hartsieste kohteeseen.
17. Peitä dentiinin herkät, paljastuneet osat.
18. UltraEZ -siedätysgeelin, Opalescence arkuutta helpottavan hammastahnan ja/tai Enamelast™ fluoridilakan käyttäminen on suositeltavaa potilaille joilla esiintyy hampaiden yliherkkyyttä ennen ja jälkeen operaation. Muita hoitovaihtoehtoja on saatavilla arkuuden vakavuudesta riippuen.
19. Hypokalsifikaatioalueita, vaikka ne eivät olisikaan kliinisesti nähtävissä, saattaa esiintyä ja ne vaalenevat nopeammin kuin ympäröivä hammaskiille. Kun potilaan hampaat vaalenevat, alueet alkavat sekoittua.
20. Mitään Ultradent-ruiskuannostelumateriaaleja ei koskaan saa pistää.
21. Pidä poissa suorasta kuumuudesta ja/tai auringonvalosta.
22. Opalescence Boost vastaanotolla tehtävä valkaisu tulisi käyttää 10 päivän kuluessa sekoittamisesta. Säilytä jääkaapissa käyttökertojen välissä.
23. Hävitä päät ja ruiskut kuten kuvattu yllä olevissa ohjeissa ja paikallisten säännösten mukaisesti.

Opalescence™ Boost™ 40% EL
Σύστημα λεύκανσης δοντιών

Περιγραφή:
Το Opalescence Boost 40% είναι μια γέλη λεύκανσης με περιεκτικότητα 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση στο ιατρείο. Η σύριγγα διπλού κυλίνδρου αυτόματης ανάμειξης διασφαλίζει τη μέγιστη ισχύ για κάθε εφαρμογή και την ακριβή δοσολογία του ενεργοποιητή. Ένας κύλινδρος περιέχει φθοριούχο νάτριο 1,1% και νιτρικό κάλιο 3% και έναν μοναδικό χημικό ενεργοποιητή που συνδυάζεται με ένα δεύτερο κύλινδρο, ο οποίος περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η τελική συγκέντρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι 40%.

Ενδείξεις χρήσης:
Το σύστημα λεύκανσης Opalescence Boost 40% προορίζεται για ιατρική χρήση και μόνο στο ιατρείο. Εφαρμόζεται από τον οδοντίατρο για τη λεύκανση ενός ή περισσότερων δοντιών. Το σύστημα λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost χρησιμοποιείται επίσης για μη-ζωτικής σημασίας δόντια, συμπεριλαμβανομένης της ενδομυλικής λεύκανσης στο ιατρείο.
Το σύστημα λεύκανσης στο ιατρείο Opalescence Boost είναι μια εναλλακτική, συντηρητική μέθοδος (σε σύγκριση με στεφάνες, όψεις κ.λπ.) για τη λεύκανση δυσχρωματικών, εσωτερικά αποχρωματισμένων δοντιών λόγω προδιάθεσης, όπως ασθένειας, τραυματικής ή ιατρογενούς βλάβης και συγγενών, συστηματικών, μεταβολικών ή φαρμακολογικών επιδράσεων. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ενδεικτικά: αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης, λεκέδες λόγω τετρακυκλίνης και μινοκυκλίνης στους ενήλικες, πορφυρία, εμβρυϊκή ερυθροβλάστωση και υψηλή πρόσληψη φθορίου κατά την ανάπτυξη των δοντιών.

Προκαταρκτικές διαδικασίες:
1. Καθαρίστε και γυαλίστε τα δόντια περίπου δύο εβδομάδες πριν από το ραντεβού για τη λεύκανση.
2. Προσδιορίστε και καταγράψτε τη βασική απόχρωση. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες, εφόσον ενδείκνυται, για την τεκμηρίωση της βασικής απόχρωσης.
3. Πριν από την ανάμιξη, αφήστε το σύστημα λεύκανσης γραφείου Opalescence Boost σε θερμοκρασία δωματίου.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ασθενής, ο ιατρός και ο βοηθός πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη και εφαρμογή αυτού του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης:
Ανάμιξη συστήματος λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost
1. Βεβαιωθείτε ότι οι σύριγγες είναι σωστά προσαρμοσμένες.
2. Αποσυμπιέστε το μικρό άδειο έμβολο στη μικρή μεσαία άδεια σύριγγα για να προκληθεί ρήξη της εσωτερικής μεμβράνης και να αναμιχθεί το λευκαντικό με τον ενεργοποιητή.
3. Πιέστε το έμβολο της κόκκινης σύριγγας εντός, αδειάζοντας όλο το περιεχόμενο στην άδεια σύριγγα.
4. Πιέστε το άδειο έμβολο προς τα πίσω, εντός της κόκκινης σύριγγας.
5. Για να αναμείξετε καλά τον ενεργοποιητή με τη γέλη λεύκανσης, πιέστε τα στελέχη προς τα πίσω και εμπρός συνεχώς με τους αντίχειρες και αναμείξτε τουλάχιστον 50 φορές ταχέως (25 φορές για κάθε πλευρά).
6. Πιέστε όλη την αναμεμειγμένη γέλη εντός της ΚΟΚΚΙΝΗΣ σύριγγας.
7. Περιστρέψτε για να διαχωρίσετε τις δύο σύριγγες και προσαρμόστε το συνιστώμενο ρύγχος (ή Black Mini™) στην κόκκινη σύριγγα.

Μόνωση - Μεμβράνη ρητίνης OpalDam™ (συνιστώμενη μόνωση):
1. Τοποθετήστε το διαστολέα στόματος Ultradent IsoBlock™ και τα αυτοϋποστηριζόμενα άγκιστρα συγκράτησης χειλιών και παρειών.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας luer lock από τη μεμβράνη ρητίνης και προσαρμόστε ένα ρύγχος ή Black Mini™.
3. Επαληθεύστε τη ροή πριν από την ενδοστόμια εφαρμογή.
4. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά τα δόντια και τα ούλα.
5. Εφαρμόστε συνεχόμενα τη μεμβράνη ρητίνης OpalDam κατά μήκος του περιθωρίου των ούλων, επικαλύπτοντας περίπου 0.5mm πάνω στην αδαμαντίνη. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε τη στεφάνη ενός δοντιού πέρα από το πιο ακραίο δόντι που λευκαίνεται.
6. Συνεχίστε με τη δημιουργία της μεμβράνης έως ότου το ύψος της φτάσει τα 4-6mm και το πάχος της τα 1,5-2,0mm.
7. Εφαρμόστε τη ρητίνη μέσω οποιωνδήποτε ανοιγμάτων στον γλωσσικό ιστό για να σφραγίσετε εντελώς και να καλύψετε την εκτεθειμένη θηλή.
8. Χρησιμοποιώντας τον καθρέπτη στόματος, εξετάστε τον επιμήκη άξονα των δοντιών για κενά ή λεπτά ανοίγματα που εκθέτουν τον υποκείμενο ιστό και εφαρμόστε ξανά τη ρητίνη.
9. Σκληρύνετε για 20 δευτερόλεπτα ανά αψίδα εκτελώντας μια κίνηση σάρωσης. Ελέγξτε προσεκτικά τη ρητίνη με ένα όργανο.

Μόνωση – Ελαστικός απομονωτήρας
1. Εφαρμόστε τον ελαστικό απομονωτήρα τοποθετώντας σφιγκτήρες αμφιπλεύρως και περιφερικά στα δόντια που πρόκειται να λευκανθούν.
2. Πριν προσαρτήσετε τον ελαστικό απομονωτήρα στο πλαίσιο, εφαρμόστε μια στρώση στεγανωτικού ελαστικού απομονωτήρα στο περιθώριο των ούλων κάτω από τον απομονωτήρα.
3. Προσαρτήστε τον απομονωτήρα στο πλαίσιο και αναστρέψτε τον ελαστικό απομονωτήρα στην άκρη των ούλων. Βεβαιωθείτε για την άριστη στεγανοποίηση.

Εφαρμογή συστήματος λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost
1. Στη γάζα ή το επίθεμα, βεβαιωθείτε για τη ροή σε όλες τις σύριγγες πριν την ενδοστοματική εφαρμογή. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήστε το ρύγχος και ελέγξτε ξανά. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ρύγχη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η αντίσταση συνεχίζεται, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύριγγα και επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για την αντικατάσταση.
2. Εφαρμόστε ένα στρώμα γέλης πάχους 0,5-1,0mm στην καθαρή χειλική επιφάνεια του δοντιού.
3. Αφήστε τη γέλη πάνω στα δόντια για 20 λεπτά, ελέγχετε περιοδικά και εφαρμόστε εκ νέου στις περιοχές, στις οποίες το υλικό έχει αραιώσει ή χρειάζεται αναπλήρωση.
4. Αναρροφήστε τη γέλη από τα δόντια χρησιμοποιώντας το Luer Vac και το SST™ (Surgical Suction Tip) ή ένα ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης. Για να αποφύγετε την εκτίναξη της γέλης, μην χρησιμοποιείτε νερό κατά την αναρρόφηση της γέλης. Όταν δεν είναι ορατή η γέλη, ξεπλύνετε ελαφρώς και στεγνώστε με αέρα. Προσέξτε μην αποσπαστεί η μονωτική μεμβράνη ή ο στεγανωτικός ελαστικός απομονωτήρας.
5. Αξιολογήστε την αλλαγή της απόχρωσης μετά από κάθε εφαρμογή και παρακολουθείτε τον ασθενή για ενδεχόμενη ευαισθησία και ερεθισμό. Εάν παρουσιαστεί επίμονη ευαισθησία των δοντιών, σταματήστε τη χρήση.
6. Αποφεύγετε την επαφή με μαλακούς ιστούς ή τη σιελογόνο ροή. Εάν παρουσιαστεί χημικός ερεθισμός λόγω επαφής του ενδοστοματικού μαλακού ιστού με τη γέλη υπεροξειδίου του υδρογόνου, σκουπίστε αμέσως τη γέλη από τον ιστό χρησιμοποιώντας μια βρεγμένη γάζα και ξεπλύνετε καλά την περιοχή. Η κατάσταση του ιστού θα ομαλοποιηθεί εντός 20-30 λεπτών.
7. Επαναλάβατε τα βήματα 2-5 έως και δύο ακόμη φορές, εάν δεν έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μην υπερβαίνετε τις 3 εφαρμογές ανά επίσκεψη.
8. Εάν διατυπωθεί η επιθυμία για μια πρόσθετη λεύκανση στο ιατρείο και εάν δεν έχει παρατηρηθεί κάποια συγκεκριμένη ευαισθησία, ανανεώστε το ραντεβού με τον ασθενή. Εάν έχει παρατηρηθεί κάποια ευαισθησία, επαναλάβετε τη θεραπεία, αφού υποχωρήσει η ευαισθησία.

Καθαρισμός
1. Αναρροφήστε τη γέλη από τα δόντια χρησιμοποιώντας το Luer Vac και το SST™ (Surgical Suction Tip) ή ένα ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά τα δόντια με ψεκαστήρα αέρα/νερού και την μέγιστη δυνατή αναρρόφηση.
2. Χρησιμοποιώντας ένα οδοντιατρικό εργαλείο, σύρετε μαλακά το ρύγχος κάτω από τη μεμβράνη ρητίνης OpalDam και ανασηκώστε. Ελέγξτε και αφαιρέστε όλα τα διαδοντικά υπολείμματα.
3. Εάν χρησιμοποιείτε έναν ελαστικό απομονωτήρα, ακολουθήστε το Βήμα 1 του καθαρισμού, αφαιρέστε τους σφιγκτήρες, τον απομονωτήρα και το πλαίσιο.
4. Αφαιρέστε τον στεγανωτικό ελαστικό απομονωτήρα με μια σπάτουλα, μαλακή οδοντόβουρτσα, οδοντικό νήμα, αναρρόφηση και ψεκασμό με αέρα/νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Η λεύκανση χρησιμοποιείται για την επαναφορά της απόχρωσης των φυσικών δοντιών στην απόχρωση των εναπομεινάντων μη αποχρωματισμένων δοντιών.
• Το αποτέλεσμα της λεύκανσης μπορεί να έχει διάρκεια 24-48 ωρών μετά από τη λεύκανση, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να παρατηρηθεί και μια ελαφρά αύξηση της λεύκανσης.
• Ένα μεμονωμένο ή και περισσότερα δόντια μπορούν να λευκανθούν με χρήση αυτής της ίδιας οδηγίας και εφαρμογή της λεύκανσης μόνο σε εκείνες τις συγκεκριμένες περιοχές του αποχρωματισμού.
• Σε περίπτωση ευαισθησίας μετά από τη λεύκανση, χρησιμοποιήστε προϊόντα νιτρικού κάλιο, όπως τη γέλη απευαισθητοποίησης UltraEZ™, αμέσως μετά από τη θεραπεία και για 15 λεπτά έως 1 ώρα ανά ημέρα, έως ότου υποχωρήσει η ευαισθησία.
• Η χάραξη του σμάλτου ή χρήση πάστας προφύλαξης πριν από οποιαδήποτε διαδικασία λεύκανσης δεν συνιστάται και δεν ενισχύει τη διαδικασία λεύκανσης αλλά μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία.

Ενδοδοντική θεραπεία δοντιών:
• Τα μη ζωτικής σημασίας δόντια μπορεί να λευκανθούν τόσο από μέσα προς τα έξω όσο και αντίστροφα, προκειμένου για πιο άμεσα αποτελέσματα.
1. Αφαιρέστε εντελώς όλο το υλικό αποκατάστασης και σφράγισης ρίζας από τον μυλικό θάλαμο του πολφού και 2-3 mm κάτω από τα υγιή ούλα. Τοποθετήστε συμβατικό ή ρητινωδώς τροποποιημένο υαλοϊονομερές πάχους 2 mm, όπως το UltraCem™, για τη σφράγιση του ενδοδοντικά επεξεργασμένου σωλήνα.
2. Ακολουθήστε τις «Οδηγίες ανάμειξης» 1-6 παραπάνω.
3. Προσαρτήστε το ρύγχος ή το ρύγχος Black mini και επαληθεύστε τη ροή πριν από την ενδοστόμια εφαρμογή.
4. Ακολουθήστε τις «Οδηγίες μόνωσης» παραπάνω, για να απομονώσετε τη χειλική και τη γλωσσική πλευρά του δοντιού.
5. Εφαρμόστε στο άνοιγμα πρόσβασης, στη χειλική, και εάν είναι επιθυμητό, στη γλωσσική επιφάνεια.
6. Αφήστε τη γέλη στο δόντι για 20 λεπτά.
7. Αναρροφήστε τη γέλη από το άνοιγμα πρόσβασης και από το δόντι χρησιμοποιώντας το Luer Vac και SST™ (Surgical Suction Tip) ή ένα ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης. Για να αποφύγετε την εκτίναξη της γέλης, μην χρησιμοποιείτε νερό κατά την αναρρόφηση της γέλης.
8. Όταν δεν είναι ορατή η γέλη, ξεπλύνετε ελαφρώς και στεγνώστε με αέρα. Προσέξτε μην αποσπαστεί η μονωτική μεμβράνη ή ο στεγανωτικός ελαστικός απομονωτήρας.
9. Αξιολογήστε την αλλαγή της απόχρωσης.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 7-11, αν χρειάζεται.
11. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να αφαιρέσετε τη μεμβράνη από τα ούλα.
12. Στεγανοποιήστε το σημείο πρόσβασης με ένα προϊόν προσωρινής επαναφοράς που δεν περιέχει ευγενόλη και ρητίνη, όπως το UltraTemp™ Regular.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Εάν είναι επιθυμητή η περαιτέρω λεύκανση, κανονίστε ένα νέο ραντεβού και επαναλάβατε τη διαδικασία λεύκανσης Opalescence Boost στο ιατρείο που περιγράφεται παραπάνω ή χρησιμοποιήστε τη λεύκανση Opalescence Endo.
• Το αποτέλεσμα της λεύκανσης μπορεί να έχει διάρκεια 24-48 ωρών μετά από τη λεύκανση, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να παρατηρηθεί και μια ελαφρά αύξηση της λεύκανσης.
• Με την πάροδο του χρόνου είναι αναμενόμενος ο αποχρωματισμός και ως εκ τούτου συνίσταται εκ νέου λεύκανση κατά μέσο όρο κάθε 3-5 έτη.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις:
1. Η υγεία των ούλων και του στόματος πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.
2. Ο ιατρός, ο βοηθός και ο ασθενής πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά προστατευτικά κατά την ανάμιξη και την εφαρμογή του συστήματος λεύκανσης Opalescence Boost στο ιατρείο.
3. Τα υλικά αποκατάστασης δεν θα λευκανθούν και ως εκ τούτου συνιστάται η λεύκανση των δοντιών πριν από την τοποθέτηση αισθητικών αποκαταστάσεων.
4. Περιμένετε 7-10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης πριν από την τοποθέτηση συγκολλητικών αποκαταστάσεων, καθώς τα υλικά λεύκανσης παρεμποδίζουν τη δράση των συγκολλητικών μέσων.
5. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
6. Αφήστε τις σύριγγες σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την ανάμειξη.
7. Επαληθεύστε τη ροή σε όλες τις σύριγγες πριν από την ενδοστόμια εφαρμογή. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήστε το ρύγχος και ελέγξτε ξανά. Εάν η αντίσταση συνεχίζεται, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτή τη σύριγγα και επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για την αντικατάσταση.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ρύγχη. Προς αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τα ρύγχη.
9. Για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, χρησιμοποιείτε καλύμματα σύριγγας μιας χρήσεως, κλείνετε το πώμα, και καθαρίζετε τη σύριγγα με ενδιάμεσης ισχύος απολυμαντικό μεταξύ των χρήσεων. Εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα, οι σύριγγες θα πρέπει να θεωρηθούν ως μιας χρήσεως.
10. Να διατηρείται μακριά από παιδιά.
11. Η λεύκανση δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες ή ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Συμβουλευθείτε τον ιατρό τους πριν από τη θεραπεία.
12. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν εφαρμόζετε το προϊόν.
13. Πριν την απόρριψη των συριγγών αναρροφήστε νερό εντός της σύριγγας και πιέστε το νερό προς τα έξω. Επαναλάβατε μερικές φορές πριν απορρίψετε τη σύριγγα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι χρησιμοποιούμενες γάζες ξεπλένονται με νερό.
14. Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία σε υπεροξείδια, γλυκόλες, ακρυλικές ενώσεις ή άλλες ρητίνες. Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, δερματίτιδα ή εξάνθημα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
15. Κατά την προστασία μιας πλήρους αψίδας, σκληρύνετε τη μεμβράνη ρητίνης χρησιμοποιώντας μια κίνηση σάρωσης για 20 δευτερόλεπτα και κρατώντας το φακό περίπου 1 cm από τη μεμβράνη και τον ιστό. Κατά την προστασία του ιστού δίπλα σε περισσότερα δόντια, σαρώστε τη μεμβράνη για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα ανά δόντι. Με ένα οδοντιατρικό εργαλείο ελέγξτε προσεκτικά τη ρητίνη για την ολοκλήρωση της θεραπείας.
16. Εάν παρατηρηθούν φυσαλίδες κατά μήκος του περιθωρίου της μεμβράνης ρητίνης OpalDam μετά την εφαρμογή του συστήματος λεύκανσης Opalescence Boost στο ιατρείο, αναρροφήστε τη γέλη, ξεπλύνετε και ελέγξτε για τυχόν διαρροή. Στεγνώστε την περιοχή και εφαρμόστε εκ νέου τη μεμβράνη ρητίνης OpalDam στην περιοχή.
17. Καλύψτε όλες τις ευαίσθητες περιοχές της εκτεθειμένης οδοντίνης.
18. Για ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα δόντια συνίσταται πριν και μετά από τη θεραπεία η χρήση της γέλης απευαισθητοποίησης UltraEZ, της οδοντόπαστας Opalescence ανακούφισης από τον πόνο και/του φθοριούχου επιχρίσματος Enamelast™. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της ευαισθησίας είναι διαθέσιμες άλλες θεραπευτικές επιλογές.
19. Ενδέχεται να υφίστανται περιοχές που παρουσιάζουν αποτιτάνωση, αν και κλινικά δεν είναι ορατές, οι οποίες θα λευκανθούν γρηγορότερα από το περιβάλλον σμάλτο. Καθώς η λεύκανση του ασθενούς θα συνεχίζεται, οι περιοχές θα ομογενοποιούνται.
20. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται ποτέ έγχυση οδοντικών υλικών Ultradent μέσω σύριγγας.
21. Να φυλάσσεται μακριά από την άμεση έκθεση σε θερμότητα ή και το φως του ήλιου.
22. Η λεύκανση Opalescence Boost στο ιατρείο πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 10 ημερών από την ανάμειξη. Διατηρείτε εντός ψυγείου μεταξύ των χρήσεων.
23. Απορρίπτετε τη ρύγχη και τη σύριγγα, όπως περιγράφεται στην παραπάνω οδηγία και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Opalescence™ Boost™ 40% NO
Tannblekingssystem

Beskrivelse:
Opalescence Boost 40% er en 40 % hydrogenperoksid, medisinsk klinikkblekingsgel. Jetmiksspøyten med 2 beholdere sikrer maksimal styrke for hver påføring, og nøyaktig dosering av aktivatoren. En beholder inneholder 1,1 % natriumfluorid og 3 % kaliumnitrat sammen med en unik kjemisk aktivator, som kombineres en andre beholder som inneholder hydrogenperoksid. Den endelige hydrogenperoksid-konsentrasjonen er 40 %.

Indikasjoner for bruk:
Opalescence Boost 40% bleking er kun for medisinsk klinikkbruk. Den påføres av tannlegen for bleking av en eller flere tenner. Opalescence Boost klinikkbleking brukes også på ikke-vitale tenner, inkludert intrakoronal klinikkbleking. Opalescence Boost klinikkbleking er en alternativ konservativ metode (sammenlignet med kroner, fasetter, osv.) for bleking av mørke, internt misfargede tenner forårsaket av predisponerte faktorer som sykdom, traumatisk eller iatrogen skade, kongenitale, systemiske, metabolske eller farmakologiske innflytelser. Disse kan inkludere, men er ikke begrenset til hevede bilirubin-nivåer, tetrasyklin og minocyklin-flekker, porfyri, føtal eryroblastose og høyt fluoridinntak under tannutvikling.

Innledende prosedyrer:
1. Rengjør og poler tennene ca. to uker før blekeavtalen.
2. Fastslå og registrer grunnlinjenyansen. Bruk fotografier når indikert for grunnlinjedokumentering.
3. La Opalescence Boost klinikkbleking nå romtemperatur før blanding.
4. ADVARSEL: Pasient, kliniker og assistent må bruke øyebeskyttelse og hansker ved blanding og påføring av dette produktet.

Bruksanvisning:
Blande Opalescence Boost klinikkbleking
1. Kontroller at sprøytene er sikkert festet.
2. Trykk det lille gjennomsiktige stemplet ned i den midtre lille gjennomsiktige sprøyten for å sprekke den interne membranen og kombinere blekemiddel og aktivator.
3. Trykk stempelet på den røde sprøyten inn for å dytte alt innholdet inn i den gjennomsiktige sprøyten.
4. Trykk det gjennomsiktige stempelet helt tilbake i den røde sprøyten.
5. For å blande aktivatoren grundig med blekingsgelen dyttes stenglene frem og tilbake kontinuerlig med tomlene, og bland minimum 50 ganger raskt (25 ganger på hver side).
6. Press all den blandede gelen inn i den RØDE sprøyten.
7. Vri for å separere de to sprøytene, og fest den anbefalte spissen (Black Mini™) godt på den røde sprøyten.

Isolering - OpalDam™ harpiksbarriere (anbefalt isolasjon):
1. Plasser Ultradent IsoBlock™ biteblokk og selvstøttende leppe-/kinnretraktorer.
2. Fjern Luer-låshetten fra OpalDam harpiksbarriere, og sett på en Black Mini™.
3. Bekreft flyt før intraoral påføring.
4. Skyll og tørk tenner og tannkjøtt grundig.
5. Press ut en kontinuerlig dråpe med OpalDam harpiksbarriere langs tannkjøttgrensen, med omtrent 0,5 mm overlapping på emaljen. Start og stopp dråpen en tann forbi den mest distale tannen som skal blekes.
6. Fortsett å bygge barrieren apikalt til den er 4-6 mm høy og 1,5-2,0 mm tykk.
7. Press ut harpiks gjennom eventuelle åpne fordypninger på tungevevet for å fullstendig forsegle og dekke eksponerte papillae.
8. Bruk munnspeilet og se opp langs tennenes lange akse for små og store åpninger som eksponerer det underliggende vevet, og påfør harpiks igjen.
9. Lysherdes i 20 sekunder pr. bue med en skannebevegelse. Kontroller harpiksherdingen nøye med et instrument.

Isolering - kofferdam
1. Påfør kofferdam ved å plassere underbundede klemmer bilateralt og en tann distalt for tennene som skal blekes.
2. Før kofferdam festes til rammen, påføres en dråpe kofferdamforsegler ved tannkjøttgrensen under kofferdammen.
3. Fest dammen til rammen og inverter kofferdammen ved tannkjøttgrensen. Kontroller for optimal forsegling.

Påføre Opalescence Boost klinikkbleking
1. På gasbind eller blandepute kontrolleres flyt i alle sprøyter før intraoral påføring. Hvis du møter motstand, erstatt tuppen og kontroller på nytt. Bruk kun anbefalte tupper. MERK: Hvis motstand fortsetter, IKKE bruk den sprøyten, og kontakt Ultradent kundeservice for erstatning.
2. Påfør et 0,5-1,0 mm tykt lag med gel på tannens rene labiale overflate.
3. La gelen være på tennene i 20 minutter, kontroller periodisk, og påfør på nytt på områder hvor det har blitt tynt eller som trenger fornying.
4. Sug gel fra tennene med Luer Vac eller SST™ (Surgical Suction Tip) eller en kirurgisk sugespiss. Ikke bruk vann under suging av gel for å unngå søl. Når ingen gel er synlig, skyll lett og lufttørk. Vær forsiktig slik at isolasjonsbarrieren eller kofferdamforseglingen ikke løsner.
5. Evaluer nyanseendring etter hver påføring, og overvåk pasient for sensitivitet og irritasjon. Hvis vedvarende tannsensitivitet inntreffer, må bruk avsluttes.
6. Unngå kontakt med mykvev eller spyttflyt. Hvis kjemisk irritasjon inntreffer fordi intraoralt mykvev kommer i kontakt med hydrogenperoksid-gel, må gelen umiddelbart tørkes av vevet med vått gasbind, og området skylles godt. Vevet bør returnere til normalt etter 20-30 minutter.
7. Gjenta trinn 2-5 opptil to ytterligere ganger hvis ønsket resultat ikke har blitt oppnådd. Ikke overskrid 3 påføringer pr. visitt.
8. Hvis ytterligere klinikkbleking er ønsket, og ingen betydelig sensitivitet er merket, kan pasienten settes opp for ny behandling som ønsket. Hvis sensitivitet oppsto, gjenta behandling når sensitiviteten har gått ned.

Opprensking
1. Sug gel fra tennene med Luer Vac og SST™ (Surgical Suction Tip) eller en kirurgisk sugespiss, og skyll deretter tennene grundig med en luft-/vannspray og høyvolum suging.
2. Før forsiktig spissen på et tanninstrument under OpalDam harpiksbarriere og løft den av. Kontroller for og fjern eventuelle interproksimale rester.
3. Hvis en kofferdam brukes, følg opprenskingstrinn 1, fjern klemmer, dam og ramme.
4. Fjern kofferdamforsegler med spatel, myk tannbørste, tanntråd, suging og fast luft-/vannspray.

MERKNADER:
• Bleking brukes for å opprette nyansen på naturlige tenner til nyansen på gjenværende ikke-misfargede tenner eller tidligere matchende restaurering.
• Blekingseffekt kan fortsette i 24-48 timer etter bleking, dermed kan en lett økning i blekningen oppstå under denne perioden.
• En enkel eller et par tenner kan blekes etter disse instruksjonene og påføring av blekemiddel kun på de spesifikke områdene med misfarging.
• For post-operativ sensitivitet, bruk kaliumnitratprodukter som UltraEZ™ desensitiviseringsgel umiddelbart etter behandling og i 15 minutter til 1 time per dag til sensitiviteten avtar.
• Polering med etsende emalje- eller profylaksepasta før blekingsprosedyre anbefales ikke, og potenserer ikke blekeprosessen, men kan føre til sensitivitet.

Endodontisk behandlede tenner:
• Ikke-vitale tenner kan blekes både fra innsiden ut og utsiden inn for å akselerere blekingshastigheten/-effektiviteten.
1. Fjern alle materialer etter gjenoppbygging og rotfylling fra koronalt massekammer og 2-3mm nedenfor sunt tannkjøtt. Plasser en 2mm tykk, vanlig glass-ionomer eller en harpiks-modifisert glass-ionomer, som UltraCem™, for å forsegle den endodontisk behandlede kanalen.
2. Følg "Blande"-instruksjonene 1-6 over.
3. Fest Black minispiss og bekreft fly før intraoral påføring.
4. Følg "Isolasjon"-instruksjonene over, og isoler både den labiale og linguale siden av tannen.
5. Press inn i tilgangsåpningen, den labiale og, om ønsket, den linguale overflaten.
6. La gelen være i tannen i 20 minutter.
7. Sug gel fra tilgangsåpningen og tannen med Luer Vac og SST™ (Surgical Suction Tip) eller en kirurgisk sugespiss. Ikke bruk vann under suging av gel for å unngå søl.
8. Når ingen gel er synlig, skyll lett og lufttørk. Vær forsiktig slik at isolasjonsbarrieren eller kofferdamforseglingen ikke løsner.
9. Evaluer nyanseendring.
10. Gjenta trinn 7-11 ved behov.
11. Følg "Opprensking"-instruksjonene for å fjerne tannkjøttbarrierer.
12. Forsegle tilgang med en ikke-eugenol og ikke-harpiks midlertidig gjenoppretting som UltraTemp™ Regular.

MERKNADER:
• Hvis ytterligere bleking er ønsket, sett opp ny avtale og gjenta Opalescence Boost klinikkblekingsprosedyren, eller bruk Opalescence Endo bleking.
• Blekingseffekt kan fortsette i 24-48 timer etter bleking, dermed kan en lett økning i blekningen oppstå under denne perioden.
• I løpet av årene kan regresjon forventet, og ny bleking i gjennomsnitt hvert 3.-5. år anbefales.

Forholdsregler og advarsler:
1. Tannkjøtt- og munnhelse bør bekreftes før bruk av dette produktet.
2. Kliniker, assistent og pasient må bruke øyebeskyttelse med sidevern ved blanding og påføring av Opalescence Boost klinikkbleking.
3. Gjenopprettende materialer vil ikke blekes, og derfor anbefales det at tennene blekes før plassering av estetiske gjenopprettinger.
4. Vent 7-10 dager etter blekeprosedyrer før gjenopprettinger plasseres, da blekemidler forstyrrer bindemidler.
5. Les SDS og alle instruksjoner nøye før bruk.
6. La sprøyter varmes til romtemperatur før bruk.
7. Kontroller flyt i alle sprøyter før intraoral påføring. Hvis du møter motstand, erstatt tuppen og kontroller på nytt. Hvis motstand fortsetter, IKKE bruk den sprøyten, og kontakt Ultradent kundeservice for erstatning.
8. Bruk kun anbefalte tupper. For å unngå krysskontaminering må spissene ikke gjenbrukes.
9. For å unngå krysskontaminering bruker du et engangs sprøytedeksel, og lukker og tørker sprøyten med desinfeksjonsmiddel mellom bruk. Hvis disse tiltakene ikke tas, bør sprøytene anses som engangs.
10. Oppbevares utilgjengelig for barn.
11. Gravide eller ammende kvinner eller pasienter med alvorlige helseproblemer bør ikke bleke. Konsulter med deres primære omsorgsperson før behandling.
12. Bruk vernehansker ved håndtering av dette produktet.
13. Før avhending av sprøytene aspireres vann inn i sprøyten og presses ut i avløpet. Gjenta et par ganger før avhending av sprøyten. Sørg for at eventuelle gasbind spyles med vann.
14. Skal ikke brukes på pasienter med kjent sensitivitet for peroksider, glykoler, akrylater eller andre harpikser. Skulle allergiske reaksjoner, dermatitt eller utslett oppstå, må lege kontaktes.
15. Når en full bue beskyttes lysherdes harpiksbarrieren på standard modus med en skannebevegelse i 20 sekunder, med linsen holdt ca. 1 cm fra barrieren og vevet. Ved beskyttelse av vev i nærheten av færre tenner, skann barrieren i ca. 3-5 sekunder per tann. Kontroller harpiksen nøye for full herding med et tanninstrument.
16. Hvis det oppstår bobler langs kanten av OpalDam harpiksbarriere etter påføring av Opalescence Boost klinikkbleking, suges gelen av, skyll og sjekk for lekkasje. Tørk området og påfør OpalDam harpiksbarriere til området igjen.
17. Dekk eventuelle sensitive områder med eksponert dentin.
18. For pasienter med kjent tannsensitivitet anbefales pre-operativ og post-operativ behandling med UltraEZ desensitiviseringsgel, Opalescence sensitivitetslindrende tannpasta og/eller Enamelast™ fluoridlakk. Andre behandlingsalternativer er tilgjengelige, avhengig av alvorlighetsgraden for sensitiviteten.
19. Områder med hypokalsifisering kan, selv om de ikke er klinisk synlig, forekomme, og vil blekes hurtigere enn nærliggende emalje. Ettersom pasientens tenner blir hvitere, vil områdene begynne å gli over i hverandre.
20. Ingen Ultradent sprøyte-leverte tannmaterialer bør noensinne injiseres.
21. Holdes vekk fra direkte varme og/eller sollys.
22. Opalescence Boost klinikkbleking bør brukes innen 10 dager etter blanding. Oppbevares kjøling mellom bruk.
23. Avhend spissene og sprøyten som beskrevet i instruksjonene over og i henhold til lokale bestemmelser.

Opalescence™ Boost™ 40% PL
System wybielania zębów

Opis:
Preparat Opalescence Boost 40% to żel wybielający zawierający 40% nadtlenku wodoru do wybielania w gabinetach stomatologicznych. 2-cylindrowa strzykawka mieszająca zapewnia maksymalną wytrzymałość dla każdego zastosowania oraz precyzyjne dozowanie za pomocą aktywatora. Jeden cylinder zawiera 1,1% fluorku sodu i 3% azotanu potasu oraz unikalny aktywator chemiczny, połączony z drugim cylindrem zawierającym nadtlenek wodoru. Ostateczne stężenie nadtlenku wodoru wynosi 40%.

Wskazania do stosowania:
Żel wybielający Opalescence Boost 40% jest przeznaczony do użytku wyłącznie w gabinetach stomatologicznych Do stosowania przez lekarza stomatologa w celu wybielania pojedynczych zębów. Preparat Opalescence Boost może być również stosowany do wybielania martwych zębów, w tym również wybielania wewnątrzkoronowego.
System Opalescence Boost do wybielania zębów w gabinecie to alternatywna, zachowawcza metoda (w porównaniu z koronami, licówkami itp.) wybielania ciemnych, wewnętrznie przebarwionych zębów z powodu działania czynników predysponujących, takich jak choroba, uraz oraz wpływy wrodzone, ustrojowe, metaboliczne lub farmakologiczne. Mogą do nich należeć m.in. podwyższone stężenie bilirubiny, przebarwienia związane ze stosowaniem tetracyklin i minocyklin, porfiria, choroba hemolityczna płodu i noworodka oraz wysokie spożycie fluoru w okresie rozwoju zębów.

Procedury przed zabiegiem:
1. Oczyścić i wypolerować zęby około dwa tygodnie przed wybielaniem.
2. Określić i zapisać odcień przed zabiegiem. W razie potrzeby dla celów dokumentacji wykonać zdjęcia.
3. Przed wymieszaniem należy doprowadzić preparat Opalescence Boost do temperatury pokojowej.
4. OSTRZEŻENIE: Pacjent, lekarz i asysta muszą mieć założone okulary ochronne i rękawiczki podczas mieszania i nakładania preparatu.

Sposób użycia:
Mieszanie preparatu Opalescence Boost do wybielania w gabinecie stomatologicznym
1. Upewnić się, czy obie strzykawki są ze sobą dobrze połączone
2. Szybko i mocno wcisnąć mały przezroczysty tłok do środkowej niewielkiej strzykawki, aby przerwać błonę wewnętrzną i połączyć wybielacz z aktywatorem.
3. Wcisnąć tłok czerwonej strzykawki i jej zawartość do przezroczystej strzykawki.
4. Całkowicie wcisnąć tłok przezroczystej strzykawki z powrotem do czerwonej strzykawki.
5. Aby dokładnie wymieszać aktywator z żelem wybielającym, przesuwać tłoki tam i z powrotem kciukami i wymieszać zawartość strzykawek co najmniej 50 razy (25 razy z każdej strony).
6. Wprowadzić całą objętość wymieszanego żelu do CZERWONEJ strzykawki.
7. Przekręcić, aby oddzielić dwie strzykawki i mocno zamocować zalecaną końcówkę (lub końcówka Black Mini™) na czerwonej strzykawce.

Izolacja – żywica ochronna OpalDam™ (zalecana izolacja):
1. Założyć blok zwarciowy Ultradent IsoBlock™ i samonośny rozwieracz do ust/policzków.
2. Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą z OpalDam Green i nałożyć końcówkę lub końcówka Black Mini™.
3. Sprawdzić wypływ materiału przed jego nałożeniem w obrębie jamy ustnej.
4. Dokładnie wypłukać i osuszyć zęby oraz dziąsła.
5. Wyciskając nałożyć pasek OpalDam Green wzdłuż krawędzi dziąseł, tak żeby zachodził na szkliwo na około 0,5mm. Nakładanie żywicy należy rozpocząć i zakończyć na zębie leżącym przed i za „krańcowymi" zębami, które będą poddawane wybieleniu.
6. Wyciskając żywicę w kierunku wierzchołków zębów uformować barierę izolującą o wysokości 4-6mm i 1,5-2mm grubości.
7. Wyciskać żywicę przez otwarte przestrzenie międzyzębowe w kierunku języka, tak aby całkowicie pokryła odsłonięte brodawki międzyzębowe.
8. Za pomocą lusterka dentystycznego przeprowadzić kontrolę wzdłuż osi długiej zębów i wprowadzić żywicę do każdego, nawet do najmniejszego zagłębienia.
9. Utwardzić żywicę lampą polimeryzacyjną naświetlając każdy łuk przez 20 sekund. Delikatnie sprawdzić naświetloną żywicę instrumentem stomatologicznym.

Izolacja - koferdam
1. Nałożyć obustronnie koferdam za pomocą klamer przewiązanych nicią, tak żeby zachodził na jeden ząb dalej niż zęby przeznaczone do wybielania.
2. Przed przyłączeniem koferdamu do obramowania, nałożyć uszczelniającą gumę koferdamu lub utwardzalną światłem warstwę żywicy na krawędź dziąseł pod koferdamem.
3. Przyłączyć koferdam do obramowania i podwinąć gumę na krawędzi dziąseł. Sprawdzić czy osiągnięto optymalny poziom uszczelnienia.

Nakładanie preparatu Opalescence Boost do wybielania w gabinecie stomatologicznym.
1. Przed nałożeniem preparatu w obrębie jamy ustnej, sprawdzić wypływ materiału ze wszystkich strzykawek na gaziku lub podkładce do mieszania. W przypadku napotkania oporu, wymienić końcówkę i ponownie sprawdzić wypływ. Używać tylko zalecanych wskazówek.
UWAGA: Jeśli opór w danej strzykawce utrzymuje się, NIE stosować jej, ale skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta firmy Ultradent w celu wymiany strzykawki.
2. Nałożyć warstwę żelu o grubości 0,5-1,0 mm nałożyć na wargową powierzchnię zęba.
3. Pozostawić żel na zębach przez 20 minut, wykonując regularną kontrolę i uzupełniając żel w miejscach, w których jego warstwa uległa ścieńczeniu lub wymaga uzupełnienia
4. Odessać żel za pomocą ssaka Luer Vac i końcówki SST™ (Surgical Suction Tip) lub ssaka chirurgicznego. Aby uniknąć rozpryskiwania żelu, podczas odsysania nie stosować wody. Gdy żel nie jest widoczny, delikatnie opłukać i osuszyć. Zachować ostrożność, aby nie przesunąć bariery izolacyjnej lub koferdamu.
5. Po każdym zastosowaniu należy sprawdzić odcień i monitorować pacjenta pod kątem wrażliwości i podrażnień. W przypadku utrzymującej się wrażliwości zębów, należy zaprzestać stosowania preparatu.
6. Unikać kontaktu z miękką tkanką lub przepływająca śliną. Jeśli podrażnienie chemiczne pojawi się w wyniku kontaktu tkanki ustnej z żelem zawierającym nadtlenek wodoru, natychmiast wytrzeć żel z tkanki za pomocą mokrej gazy i dobrze opłukać to miejsce. Tkanka powinna powrócić do normy w ciągu 20-30 minut.
7. Powtórzyć czynności z etapów 2-5 razy, lub do momentu uzyskania pożądanego rezultatu. Nie stosować więcej niż 3 aplikacje podczas jeden wizyty.
8. W przypadku gdy potrzebne jest dodatkowe wybielenie i nie zauważono istotnej wrażliwości na preparat, można umówić pacjenta na kolejną wizytę, w celu powtórzenia zabiegu. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości zębów, powtórzyć leczenie po jej ustąpieniu.

Oczyszczanie
1. Po odessaniu żelu z zębów za pomocą ssaka Luer Vac z końcówką SST™ (Surgical Suction Tip) lub ssaka chirurgicznego, dokładnie opłukać zęby za pomocą dmuchawki/sprayu wodnego i intensywnego ssania.
2. Delikatnie wsunąć końcówkę instrumentu dentystycznego pod żywicę OpalDam Green i podważyć ją. Sprawdzić i usunąć ewentualne pozostałości preparatu z przestrzeni międzyzębowych.
3. W przypadku stosowania koferdamu, wykonać czynności z punktu 1 sekcji „Oczyszczanie", usunąć klamry, koferdam oraz obramowanie.
4. Usunąć koferdam za pomocą szpatułki, miękkiej szczoteczki do zębów, nici dentystycznej, ssania i dmuchawki/sprayu wodnego.

UWAGI:
• Wybielanie jest stosowane w celu przywrócenia odcienia naturalnych zębów do odcienia pozostałych nieodbarwionych zębów lub poprzednio dopasowanego uzupełnienia.
• Wybielanie można kontynuować po odczekaniu 24-48 godzin, dlatego w tym okresie może nastąpić nieznaczny wzrost efektu wybielania.
• Wybielanie pojedynczych lub kilka zębów można przeprowadzić stosując te same instrukcje i nakładając preparat wybielający tylko na przebarwione obszary.
• W celu ograniczenia pozabiegowej nadwrażliwości zębów, bezpośrednio po zabiegu stosować produkty z azotanem potasu, takie jak UltraEZ™ oraz stosować je przez 15 minut do godziny każdego dnia aż do ustąpienia objawów nadwrażliwości.
• Wytrawianie szkliwa lub polerowanie z użyciem pasty polerskiej przed procedurą wybielania nie jest zalecane i nie wzmacnia efektu wybielania, ale może powodować nadwrażliwość.

Zęby leczone endodontycznie:
• Martwe zęby mogą być wybielane zarówno na zewnątrz, jak i od zewnątrz, aby przyspieszyć szybkość/skuteczność wybielania.
1. Całkowicie usunąć materiał wypełnienia i uszczelniacz korzenia z jamy miazgi w części koronowej oraz 2–3 mm poniżej zdrowego dziąsła. Umieścić tradycyjny cement szklano-jonomerowy lub zmodyfikowany żywicą cement szklano-jonomerowy, np. UltraCem™, nakładając go warstwą o grubości 2 mm, aby uszczelnić kanał leczony endodontycznie.
2. Wykonać czynności opisane w sekcji „Mieszania" 1-6 powyżej.
3. Nałożyć końcówkę Black mini i sprawdzić wypływ materiału przed aplikacją w obrębie jamy ustnej.
4. Zastosować się do wskazówek z sekcji „Izolacja", izolując zarówno powierzchnię wargową jak i językową zęba. (Ryc. 8)
5. Wprowadzić żel do otwartych przestrzeni międzyzębowych i do powierzchni wargowej zębów.
6. Żel na zębie pozostawić przez 20 minut.
7. Odessać żel z przestrzeni międzyzębowych i zębów za pomocą ssaka Luer Vac i końcówki SST™ (Surgical Suction Tip) lub ssaka chirurgicznego Aby uniknąć rozpryskiwania żelu, podczas odsysania żelu nie stosować wody.
8. Gdy żel nie jest widoczny, delikatnie opłukać i osuszyć. Zachować ostrożność aby nie przesunąć bariery izolacyjnej lub koferdamu.
9. Ocenić zmianę odcienia.
10. W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w punktach 7-11.
11. Usunąć warstwy izolujące z dziąseł wykonując czynności opisane w sekcji „Oczyszczanie".
12. Osłonić ujście prowizorycznym wypełnieniem nie zawierającym eugenolu lub żywicy, np. UltraTemp™ Regular.

UWAGI:
• Jeśli wskazane jest dalsze wybielenie zębów, należy ponownie zaplanować i powtórzyć procedurę wybielania preparatem Opalescence Boost w gabinecie stomatologicznym lub preparatem Opalescence Endo do wybielania zębów martwych.
• Wybielanie można kontynuować po odczekaniu 24-48 godzin, dlatego w tym okresie może nastąpić nieznaczny wzrost efektu wybielania.
• Na przestrzeni lat należy oczekiwać zmniejszenia efektu wybielania i zaleca się ponowne wybielenie po upływie 3-5 lat.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:
1. Przed zastosowaniem preparatu ocenić stan dziąseł i jamy ustnej.
2. Lekarz, asysta i pacjent muszą nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami podczas mieszania i nakładania preparatu wybielającego Opalescence Boost.
3. Wypełnienia nie wybielają się i dlatego zaleca się wybielenie zębów przed umieszczeniem uzupełnień protetycznych.
4. Po przeprowadzeniu procedur wybielania należy poczekać 7–10 dni z umieszczeniem wypełnień adhezyjnych, ponieważ materiały wybielające zakłócają działanie środków wiążących.
5. Dokładnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych i wszystkimi instrukcjami przed zastosowaniem preparatu.
6. Przed zmieszaniem doprowadzić zawartość obu strzykawek do temperatury pokojowej.
7. Przed zastosowaniem preparatu w obrębie jamy ustnej, sprawdzić wypływ materiału ze wszystkich strzykawek. W przypadku napotkania oporu, wymienić końcówkę i ponownie sprawdzić wypływ. Jeśli opór w danej strzykawce utrzymuje się, NIE stosować jej, ale skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta Ultradent w celu wymiany strzykawki.
8. Używać tylko zalecanych wskazówek. Nie używać ponownie końcówek, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
9. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, między kolejnymi zastosowaniami używać jednorazowej osłony strzykawki, zamykać butelkę i przecierać strzykawkę środkiem dezynfekującym zapewniającym średni poziom odkażenia. Jeśli środki te nie zostaną podjęte, strzykawki należy uznać za jednorazowe.
10. Chronić przed dziećmi.
11. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pacjenci z poważnymi problemami zdrowotnymi nie powinni poddawać się zabiegom wybielania zębów. Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się ze swoim lekarzem.
12. Podczas pracy z preparatem nosić rękawice ochronne.
13. Przed wyrzuceniem strzykawek, naciągnąć do nich wodę, żeby rozcieńczyć i usunąć pozostałości żelu wybielającego. Powtórz tę czynność kilka razy przed wyrzuceniem strzykawki. Upewnić się, że wszystkie używane gaziki są spłukane wodą.
14. Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na nadtlenki, glikole, akrylaty lub inne żywice. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznych, zapalenia skóry lub wysypki skontaktować się z lekarzem internistą.
15. Podczas ochrony pełnego łuku, utwardzać żywicę ochronną w trybie standardowym, naświetlając przez 20 sekund i utrzymując soczewkę w odległości około 1 cm od izolacji i tkanki. Podczas ochrony tkanki sąsiadującej z mniejszą ilością zębów utwardzać ochronę przez około 3-5 sekund na jeden ząb. Za pomocą instrumentu dentystycznego dokładnie sprawdzić stan żywicy, aby uzyskać pełne utwardzenie.
16. Jeśli pojawią się pęcherzyki wzdłuż krawędzi ochrony z żywicy OpalDam po zastosowaniu wybielania preparatem Opalescence Boost, odessać żel, spłukać pozostałości i sprawdzić szczelność. Osuszyć i ponownie nałożyć izolację z żywicy OpalDam na to miejsce.
17. Osłonić wszystkie wrażliwe obszary z odsłoniętą zębiną.
18. W przypadku pacjentów o stwierdzonej nadwrażliwości zębów, zaleca się stosowanie przed- i pozabiegowej terapii żelem odczulającym UltraEZ oraz pastą do zębów Opalescence zmniejszającą wrażliwość i/lub lakierem fluorkowym Enamelast™. W zależności od stopnia nadwrażliwości dostępne są również inne opcje leczenia.
19. Obszary hipokalcjacji, choć nie są klinicznie widoczne, mogą istnieć i zostaną wybielone szybciej niż otaczające je szkliwo. Gdy pacjent będzie ponawiać wybielanie, odcienie tych obszarów zaczną się wyrównywać.
20. Wszystkie materiały stomatologiczne aplikowane za pomocą strzykawki Ultradent nie są przeznaczone do iniekcji.
21. Chronić przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury i/lub słońca.
22. Preparat Opalescence Boost do wybielania w gabinecie stomatologicznym należy zastosować w ciągu 10 dni od wymieszania. Przechowywać w lodówce między użyciami.
23. Wyrzucić końcówki i strzykawki zgodnie z instrukcją i zachowaniem środków ostrożności.

Opalescence™ Boost™ 40% CS
Systém pro bělení zubů

Popis
Přípravek Opalescence Boost 40% je 40% peroxid vodíku, lékařský bělicí gel do ordinací. Míchací stříkačka se 2 válci a rychlou aplikací zajišťuje maximální pevnost při každém použití a přesné dávkování aktivátoru. Jeden váleček obsahuje 1,1 % fluoridu sodného a 3 % dusičnanu draselného společně s jedinečným chemickým aktivátorem, který se kombinuje s druhým válečkem obsahujícím peroxid vodíku. Konečná koncentrace peroxidu vodíku činí 40 %.

Indikace k použití:
Bělení pomocí přípravku Opalescence Boost 40% je určeno pouze pro lékařské ordinace. Aplikuje ho zubní lékař za účelem vybělení jednoho nebo více zubů. Bělení v ordinaci pomocí přípravku Opalescence Boost se používá také u neklíčových zubů, včetně bělení korunek v ordinaci.
Bělení zubů v ordinaci pomocí přípravku Opalescence Boost představuje alternativní a konzervativní metodu (v porovnání s korunkami, můstky apod.) pro bělení tmavých a vnitřně odbarvených zubů, což bývá způsobeno predispozičními faktory, jako je onemocnění, traumatické nebo iatrogenní zranění, kongenitálními, systémovými, metabolickými nebo farmakologickými vlivy. Ty mohou mimo jiné zahrnovat zvýšenou úroveň bilirubinu, tetracyklinové a minocyklinové skvrny u dospělých, porfyrii, erythroblastosis fetalis a vysoký příjem fluoridu během vývoje zubů.

Předběžné postupy:
1. Před samotným bělením si zuby přibližně dva týdny čistěte a leštěte.
2. Určete a zaznamenejte základní odstín. Při indikaci pro základní dokumentaci použijte fotografie.
3. Před smícháním ohřejte přípravek Opalescence Boost pro bělení v ordinaci na pokojovou teplotu.
4. VAROVÁNÍ: Pacient, lékař a asistent musí při míchání a aplikaci tohoto produktu nosit ochranné brýle a rukavice.

Pokyny k použití:
Míchání přípravku Opalescence Boost pro bělení v ordinaci
1. Zkontrolujte, zda jsou stříkačky bezpečně upevněny.
2. Stlačte malý čirý píst do prostřední části malé čiré stříkačky a prolomte tak vnitřní membránu, abyste zkombinovali bělidlo a aktivátor.
3. Stiskněte píst červené stříkačky a vytlačte veškerý obsah do čiré stříkačky.
4. Vytáhněte píst zcela zpět do červené stříkačky.
5. Aby došlo k důkladnému promíchání aktivátoru s bělicím gelem, minimálně 50krát (25krát na každou stranu) zatlačte dříky tam a zpět pomocí palce.
6. Natlačte veškerý namixovaný gel do ČERVENÉ stříkačky.
7. Kroucením oddělte obě stříkačky a bezpečně připojte doporučenou špičku (nebo špičku Black Mini™) na červenou stříkačku.

Izolace – pryskyřičná izolace OpalDam™ (doporučená izolace):
1. Umístěte blok proti skousnutí Ultradent IsoBlock™ a samonosné retraktory rtu/tváře.
2. Demontujte víčko Luer lock z pryskyřičné izolace OpalDam a bezpečně připevněte špičku nebo špičku Black Mini™.
3. Před aplikací do úst ověřte tok.
4. Důkladně opláchněte a osušte zuby a dásně.
5. Naneste souvislý pás pryskyřičné izolace OpalDam společně s okrajem dásně tak, aby přesahovat přibližně 0,5 mm do skloviny. Nanášení pásu zahajte a ukončete jeden zub za nejvzdálenějším běleným zubem.
6. Pokračujte ve tvorbě bariéry apikálně, dokud nedosáhne výšky 4–6 mm a síly 1,5–2,0 mm.
7. Aplikujte pryskyřici do otevřených diastem na tkáň jazyka a plně zakryjte a utěsněte exponovanou papilu.
8. Pomocí zrcátka v ústech zkontrolujte dlouhou osu zubu, zda neobsahuje mezery nebo drobné otvory odhalující níže ležící tkáň, a znovu aplikujte pryskyřici.
9. Proveďte opakovaného přejíždění o trvání 20 sekund na jeden oblouk provádějte ošetření světlem. Pečlivě zkontrolujte vytvrzení pryskyřice nástrojem.

Izolace – pryžová bariéra
1. Aplikujte pryžovou bariéru umístěním ligovaných svorek bilaterálně a o jeden zub distálněji vůči běleným zubům.
2. Před upevněním pryžové bariéry k rámu naneste pás pryžového těsnicího prostředku bariéry pod bariéru na okraj dásně.
3. Připevněte bariéru k rámu a obraťte pryžovou bariéru na okraji dásně. Ověřte optimální utěsnění.

Aplikace přípravku Opalescence Boost při bělení v ordinaci
1. Před aplikací do ústní dutiny ověřte průtok všech stříkaček na gáze nebo míchací podložce. Cítíte-li odpor, vyměňte špičku a znovu stav zkontrolujte. Používejte pouze doporučené špičky.
POZNÁMKA: Pokud je odpor nadále patrný, NEPOUŽÍVEJTE danou stříkačku a kontaktujte zákaznický servis společnosti Ultradent, abyste zajistili její výměnu.
2. Naneste vrstvu gelu o síle 0,5–1,0 mm a očistěte povrch zubu u rtu.
3. Nechte gel na zubu 20 minut a pravidelně jej kontrolujte a znovu nanášejte na oblasti, kde se vrstva tenčí nebo kde vyžaduje doplnění.
4. Odsajte gel ze zubu pomocí nástroje Luer Vac a SST™ (Surgical Suction Tip) nebo chirurgické sací špičky. Aby nedošlo k odstříkování gelu, nepoužívejte při odsávání gelu vodu. Když už není gel viditelný, lehce místo opláchněte a osušte vzduchem. Dávejte pozor, abyste neposunuli izolační přepážku ani pryžovou bariéru.
5. Po každé aplikaci zhodnoťte změnu odstínu a sledujte pacienta, zda nejeví známky citlivosti či podráždění. Pokud přetrvává citlivost zubů, dále nepokračujte.
6. Vyhněte se kontaktu s měkkými tkáněmi nebo slinami. Pokud dojde k chemickému podráždění vlivem styku měkké tkáně v ústní dutině s gelem peroxidu vodíku, okamžitě otřete gel ze tkáně pomocí vlhké gázy a dobře oblast opláchněte. Tkáň by se měla vrátit do normálního stavu během 20–30 minut.
7. Pokud nebylo dosaženo požadovaných výsledků, opakujte kroky 2–5 až dvakrát. Nepřekračujte 3 aplikace na návštěvu.
8. Pokud je nutné dodatečné bělení v ordinaci a není zjištěna žádná významná citlivost, zákrok přeplánujte a opakujte léčbu pacienta dle jeho požadavků. Pokud zjistíte citlivost, opakujte léčbu, jakmile citlivost ustoupí.

Čištění
1. Odsajte gel ze zubů pomocí nástroje Luer Vac a SST™(Surgical Suction Tip) nebo chirurgické sací špičky a pak pečlivě opláchněte zuby postřikem vzduchu/vody a vysokoobjemového odsávání.
2. Pomocí dentálního přístroje posuňte špičku pod pryskyřičnou izolaci OpalDam a zvedněte ji. Zkontrolujte a odstraňte interproximální zbytky.
3. Pokud používáte pryžovou bariéru, postupujte podle kroku čištění č. 1, odstraňte svorky, bariéru a rám.
4. Těsnicí prostředek bariéry odstraňte pomocí špachtle, jemného kartáčku, nitě, sání a silného postřiku vzduchu/vody.

POZNÁMKY:
• Bělení se používá pro návrat přirozeného odstínu zubů do odstínu zbývajících nezbarvených zubů nebo k obnovení původního odpovídajícího zbarvení.
• Bělicí účinek může pokračovat 24–48 hodin po bělení, během této doby proto může dojít k mírnému dodatečnému vybělení.
• Prostřednictvím tohoto pokynu lze bělit jeden nebo několik zubů a aplikovat bělidlo pouze na tyto konkrétní zbarvené oblasti.
• Na citlivost po zákroku používejte produkty dusičnanu draselného, například znecitlivující gel UltraEZ™, okamžitě po provedení zákroku a poté po dobu 15 minut až 1 hodiny denně, dokud citlivost neustoupí.
• Leptání skloviny nebo leštění pomocí čisticí pasty před bělením není doporučeno a nezvyšuje účinnost procesu bělení, ale může způsobit vznik citlivosti.

Endodonticky léčené zuby:
• Neklíčové zuby lze bělit zevnitř i zvenku a zrychlit tak rychlost/účinnost bělení.
1. Zcela odeberte veškerý výplňový a pečeticí materiál na kořeny z koronární dřeňové dutiny a 2–3 mm pod zdravou dásní. Umístěte běžný skleněný ionomer o velikost 2 mm nebo pryskyřicí upravený skleněný ionomer, například UltraCem™, pro zapečetění endodonticky ošetřeného kanálku.
2. Řiďte se pokyny „Míchání" uvedenými v bodech 1–6 výše.
3. Připevněte špičku nebo špičku Black mini a před aplikací do ústní dutiny ověřte tok.
4. Řiďte se pokyny „Izolace" výše a izolujte jak labiální, tak i linguální strany zubu.
5. Aplikujte do přístupového otvoru, na labiální a v případě potřeby i lingvální povrch.
6. Nechte gel působit na zubu 20 minut.
7. Odsajte gel z přístupového otvoru a zubu pomocí nástroje Luer Vac a SST™ (Surgical Suction Tip) nebo chirurgické sací špičky. Aby nedošlo k odstříkování gelu, nepoužívejte při odsávání gelu vodu.
8. Když už není gel viditelný, lehce místo opláchněte a osušte vzduchem. Dávejte pozor, abyste neposunuli izolační přepážku ani pryžovou bariéru.
9. Zhodnoťte změnu odstínu.
10. Opakujte kroky 7–11 dle potřeby.
11. Řiďte se pokyny „Čištění" k odstranění bariér na dásních.
12. Utěsněte přístup pomocí dočasného restoračního prostředku neobsahujícího eugenol a pryskyřici, například UltraTemp™ Regular.

POZNÁMKY:
• V případě potřeby dalšího bělení přeplánujte a opakujte postup bělení přípravkem Opalescence Boost v ordinaci uvedený výše nebo použijte bělení Opalescence Endo.
• Bělicí účinek může pokračovat 24–48 hodin po bělení, během této doby proto může dojít k mírnému dodatečnému vybělení.
• V průběhu let lze očekávat regresi, doporučujeme proto provádět opětovné bělení v průměru po 3–5 letech.

Bezpečnostní opatření a varování:
1. Před použitím tohoto produktu je třeba ověřit zdravotní stav dásní a ústní dutiny.
2. Lékař, asistent a pacient musí při míchání a aplikaci přípravku Opalescence Boost pro bělení v ordinaci nosit ochranné brýle s bočními štíty.
3. Opravné materiály se nevybělí a proto doporučujeme zuby bělit před umístěním estetických oprav.
4. Po bělení počkejte 7–10 dní, než nalepíte náhrady, bělicí materiály totiž narušují pojiva.
5. Před použitím si pečlivě si přečtěte SDS a všechny pokyny.
6. Před smícháním ohřejte stříkačky na pokojovou teplotu.
7. Před aplikací do ústní dutiny ověřte tok všech stříkaček. Cítíte-li odpor, vyměňte špičku a znovu stav zkontrolujte. Pokud je odpor nadále patrný, NEPOUŽÍVEJTE danou stříkačku a kontaktujte zákaznický servis společnosti Ultradent, abyste zajistili její výměnu.
8. Používejte pouze doporučené špičky. Špičky nepoužívejte opakovaně, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.
9. Abyste zamezili křížové kontaminaci, používejte mezi použitími jednorázový kryt stříkaček; nasaďte ho a otřete stříkačku pomocí okamžitého dezinfekčního prostředku. Pokud nebudou tato opatření provedena, stříkačky je třeba považovat za jednorázové.
10. Udržujte mimo dosah dětí.
11. Bělení není vhodné pro těhotné nebo kojící ženy ani pro pacienty s vážnými zdravotními potížemi. Před léčbou se poraďte s praktickým lékařem pacienta.
12. Při manipulaci s tímto produktem noste ochranné rukavice.
13. Před likvidací stříkaček do nich nasajte vodu a vytlačte ji do výlevky. Před likvidací stříkačky tento postup několikrát opakujte. Zajistěte, aby byly všechny použité gázy opláchnuty vodou.
14. Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na peroxidy, glykoly, akryláty nebo další pryskyřice. V případě alergické reakce, dermatitidy nebo vyrážky se poraďte s lékařem.
15. Při ochraně celého oblouku lehce vytvrďte pryskyřičnou izolaci ve standardním režimu pomocí pohybu tam a zpět po dobu 20 sekund, čočku přitom držte přibližně 1 cm od izolace a tkáně. Při ochraně tkáně sousedící s menším počtem zubů izolaci krátce ozařujte po dobu přibližně 3–5 sekund na jeden zub. Pomocí zubního přístroje opatrně zkontrolujte plné vytvrzení pryskyřice.
16. Pokud se po okraji pryskyřičné izolace OpalDam vyskytnou po aplikaci přípravku Opalescence Boost pro bělení v ordinaci bublinky, gel odsajte, opláchněte a zkontrolujte netěsnosti. Oblast osušte a znovu aplikujte pryskyřičnou izolaci OpalDam na místo.
17. Zakryjte všechny citlivé oblasti exponované zuboviny.
18. U pacientů se známou citlivostí zubů, předoperačním a postoperačním vyšetřením pomocí desenzitizujícího gelu UltraEZ doporučujeme použít citlivost odstraňující zubní pastu Opalescence a/nebo fluoridový lak Enamelast™. V závislosti na závažnosti citlivosti jsou k dispozici další možnosti léčby.
19. Mohou existovat oblasti odvápnění, i když nejsou klinicky viditelné, a ty se vybělí rychleji než okolní sklovina. Pokud bude pacient pokračovat v bělení, oblasti se začnou slévat.
20. Žádné zubní materiály Ultradent aplikované stříkačkou nesmí být nikdy podávány injekčně.
21. Udržujte mimo dosah přímého zdroje tepla a/nebo slunečního světla.
22. Přípravek Opalescence Boost pro bělení v ordinaci je třeba použít do 10 dnů od smíchání. Mezi použitím uložte v chladu.
23. Špičky a stříkačku zlikvidujte, jak je uvedeno v pokynech výše a v souladu s místními předpisy.

Opalescence™ Boost™ 40% RU
Система для отбеливания зубов

Описание:
Opalescence Boost 40% — это 40% отбеливающий гель для клинического использования. Шприц для струйной смеси с 2 цилиндрами обеспечивает максимальную прочность для каждого применения и точную дозировку активатора. В первом цилиндре содержится 1,1% фторида натрия и 3% нитрата калия, а также уникальный химический активатор, который сочетается со вторым цилиндром, содержащим перекись водорода. Конечная концентрация перекиси водорода составляет 40%.

Показания к применению:
40% отбеливающий гель Opalescence Boost применяется только для клинического использования. Он используется стоматологами для отбеливания одного или нескольких зубов. Отбеливающий гель Opalescence Boost для клинического использования также применяется для депульпированных зубов, включая амбулаторное внутрикоронковое отбеливание.
Отбеливающий гель Opalescence Boost для клинического использования является альтернативным консервативным методом (по сравнению с коронками, винирами и т.д.) для лечения темных, пигментированных зубов, вызванных предрасполагающими факторами, такими как заболевания, травматические или ятрогенные повреждения, а также факторы вызванные врожденными, системными, метаболическими или фармакологическими воздействиями. Они могут включать повышенный уровень билирубина, пятна от применения тетрациклина и миноциклина у взрослых, порфирию, врожденный эритропоэз, а также высокое потребление фтора во время развития зубов.

Процедура предварительной подготовки:
1. Приблизительно за две недели до назначенной процедуры отбеливания провести тщательную чистку и полировку зубов.
2. Определить и зафиксировать исходный оттенок. Для фиксирования исходного уровня следует использовать фотографии в соответствии с руководством.
3. Перед смешиванием геля Opalescence Boost для клинического использования дайте ему нагреться до комнатной температуры.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смешивании и нанесении продукта врач, его ассистент и пациент должны пользоваться перчатками и защитными очками с боковыми щитками.

Указания по применению:
Смешивание Opalescence Boost для клинического использования
1. Перед смешиванием проверьте надежность крепления шприцев.
2. Нажмите на маленький прозрачный поршень в маленьком прозрачном шприце, чтобы продавить внутреннюю мембрану и смешать отбеливатель и активатор.
3. Нажмите на красный поршень, чтобы содержимое красного шприца переместилось в прозрачный шприц.
4. Нажмите на прозрачный поршень, чтобы содержимое полностью переместилось в красный шприц.
5. Чтобы тщательно перемешать активатор с отбеливающим гелем, быстро нажимая на поршни большими пальцами, смешайте минимум 50 раз (по 25 раз с каждой стороны).
6. Выдавите весь смешанный гель в КРАСНЫЙ шприц.
7. Поверните, чтобы разъединить шприцы и крепко прикрепите к красному шприцу рекомендуемую насадку (или Black Mini™).

Изоляция – защитного барьера OpalDam™ (рекомендованное средство для изоляции):
1. Поместите прикусной блок Ultradent IsoBlock™ и ретракторы для губ / щеки.
2. Снимите люэровский наконечник со шприца защитного барьера OpalDam и надежно установите насадку или Black Mini™
3. Перед применением средства в ротовой полости проверьте, насколько хорошо оно выдавливается из шприца.
4. Промойте и высушите поверхность зубов и десен.
5. Нанесите полоску защитного барьера OpalDam вдоль десневого края, так чтобы средство покрыло приблизительно 0,5 мм зубной эмали. Полоска защитного средства должна начинаться и заканчиваться на один зуб дальше самого дистального зуба, подлежащего отбеливанию.
6. Продолжайте наносить средство от корня зуба к коронке, пока барьер не достигнет 4–6 мм в высоту и 1,5–2,0 мм в толщину.
7. Также тщательно нанесите средство через все открытые межзубные промежутки на лингвальную ткань, чтобы полностью закрыть и защитить открытые межзубные сосочки.
8. Используя зеркало для рта, тщательно просмотрите всю зубную ось на наличие зазоров или открытых отверстий, обнажая подлежащие ткани, после чего повторно нанесите смолу.
9. Выполните светоотверждение в течение 20 секунд на каждый зубной ряд при помощи сканирующего движения. С помощью инструмента осторожно проверьте, затвердела ли смола.

Изоляция — пластина из латекса
1. Прикрепите пластину из латекса с помощью клемм-зажимов с двух сторон и с каждой стороны на один зуб дальше самого дистального зуба, подлежащего отбеливанию.
2. Перед прикреплением пластины к рамке нанесите на десневой край под пластину полоску силера для латекса.
3. Прикрепите пластину к рамке и заверните ее на десневой край. Проверьте качество барьера.

Нанесение Opalescence Boost для клинического использования
1. Перед каждым применением средства в ротовой полости проверяйте на марле или бумаге для смешивания, выдавливается ли оно из шприца. При чрезмерном сопротивлении замените насадку и повторите проверку. Используйте только рекомендованные насадки. ПРИМЕЧАНИЕ: Если средство все равно выдавливается с трудом, НЕ пользуйтесь этим шприцем и обратитесь в отдел обслуживания клиентов Ultradent для его замены.
2. Нанесите на лабиальную поверхность зуба слой геля толщиной 0,5–1,0 мм.
3. Оставьте гель на зубах в течение 20 минут. Периодически проверяйте и повторно нанесите его на области, где слой геля истончился.
4. Удалите гель с зубов с помощью Luer Vac и SST™ (Surgical Suction Tip) или хирургического всасывающего наконечника. Не допускайте разбрызгивания геля, не используйте воду при отсасывании геля . Когда гель исчезнет, слегка промойте и высушите воздухом. Соблюдайте осторожность, чтобы не сместить изолирующий барьер или закрепленную пластину из латекса.
5. Оценивайте изменение оттенка после каждого применения и следите за признаками чувствительности и раздражения у пациента. При возникновении постоянной чувствительности зубов, прекратите использование.
6. Избегайте контакта с глазами или слюнным потоком. Если химическое раздражение происходит из-за того, что внутриротовая мягкая ткань входит в контакт с гелем перекиси водорода, немедленно протрите гель с тканей с помощью мокрой марли и тщательно промойте область. Ткани должны вернуться в нормальное состояние в течение 20-30 минут.
7. Повторите шаги 2-5 до двух дополнительных раз, если желаемый результат не был достигнут. Не наносите более 3 раз за одно посещение.
8. При необходимости дополнительное отбеливание в клинических условиях и отсутствии повышенной чувствительности зубов, перезапишите пациента на повторный прием по желанию. При наличии повышенной чувствительности зубов, повторите лечение, когда чувствительность уменьшится.

Очистка после процедуры
1. Удалите гель с зубов с помощью Luer Vac и SST™ (Surgical Suction Tip) или хирургического всасывающего наконечника, затем тщательно промойте зубы воздухом/водой с применением слюноотсоса.
2. С помощью стоматологического инструмента осторожно подденьте край отвержденного защитного барьера OpalDam и удалите его. При необходимости удалите остатки средства из межзубного пространства.
3. При использовании латексной пластины следуйте шагу 1, затем снимите зажимы, пластину и рамку.
4. С помощью шпателя, мягкой зубной щетки, отсоса и сильной струи воды/воздуха удалите силер для латекса.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Отбеливание используется для возврата естественного оттенка зубов к оттенку оставшихся не обесцвеченных зубов или оттенку предшествующего раннему восстановлению.
• Отбеливающий эффект может продолжаться в течение 24-48 часов после отбеливания, поэтому оттенок отбеливания в этот период может увеличиться.
• Следуя этим же инструкциям и нанося отбеливающее средство только необходимые участки с измененным оттенком, можно отбелить отдельный зуб или несколько зубов.
• При наличии чувствительности после процедуры используйте продукты с содержанием нитрата калия, например UltraEZ™ десенсибилизирующий гель, сразу после процедуры; средства наносятся на 15 мин–1 час в день до исчезновения повышенной чувствительности.
• Протравливание эмали или полировка специальной пастой перед любой процедурой отбеливания не рекомендуется и не усиливает процесс отбеливания, но может вызвать повышенную чувствительность.

Эндодонтически обработанные зубы:
• Неживые зубы можно отбелить как изнутри, так и снаружи, чтобы ускорить скорость/эффективность отбеливания.
1. Полностью удалите все композитные и прокладочные материалы из пульповой камеры, а также на 2-3 мм ниже здоровой десны. Поместите обычный 2-миллиметровый стеклянный иономер или модифицированный смолой стеклянный иономер, например UltraCem™, для герметизации эндодонтически обработанного канала.
2. Следуйте инструкциям по смешиванию вещества (1-6) выше.
3. Установите насадку Black Mini. Перед применением средства в ротовой полости проверьте, насколько хорошо оно выдавливается из шприца.
4. Следуйте инструкциям по изоляции выше, изолируя как губные, так и языковые стороны зуба.
5. Выдавите в отверстие на губную и, если хотите, лингвальную поверхность.
6. Позвольте гелю оставаться в зубе в течение 20 минут.
7. Удалите гель из отверстий и зубов с помощью Luer Vac и SST™ (Surgical Suction Tip) или хирургического всасывающего наконечника. Не допускайте разбрызгивания геля, не используйте воду при отсасывании геля.
8. Когда гель исчезнет, слегка промойте и высушите воздухом. Соблюдайте осторожность, чтобы не сместить изолирующий барьер или закрепленную пластину из латекса.
9. Оцените изменение оттенка.
10. При необходимости повторите шаги 7-11.
11. Следуйте инструкциям по очистке, чтобы удалить десневые барьеры.
12. Уплотните с использованием незвгенольного и не смолистого вспомогательного восстановителя, такого как UltraTemp™ Regular.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости дополнительного отбеливания, необходимо провести отдельную повторную процедуру отбеливания с помощью Opalescence Boost для клинического использования или используйте отбеливание Opalescence Endo.
• Отбеливающий эффект может продолжаться в течение 24-48 часов после отбеливания, поэтому оттенок отбеливания в этот период может увеличиться.
• По прошествии лет следует ожидать регрессии и рекомендуется повторное отбеливание в среднем каждые 3-5 лет.

Меры предосторожности и предупреждения:
1. Перед использованием данного препарата необходимо проверить состояние десен и полости рта на отсутствие повреждений.
2. При смешивании и использовании Opalescence Boost для клинического использования медработник, ассистент и пациент должны использовать средства защиты глаз с боковыми щитками.
3. Восстановительные материалы не подлежат отбеливанию и поэтому рекомендуется отбеливать зубы до нанесения восстановительных материалов.
4. Подождите 7-10 дней после процедуры отбеливания перед проведением адгезивных реставраций, поскольку отбеливающие материалы мешают связующим веществам.
5. Перед использованием внимательно прочитайте данные о безопасности материалов и все инструкции.
6. Перед смешиванием необходимо дать шприцам нагреться до комнатной температуры.
7. Перед каждым применением средства в ротовой полости проверяйте, выдавливается ли оно из шприца. При чрезмерном сопротивлении замените насадку и повторите проверку. Если средство все равно выдавливается с трудом, НЕ пользуйтесь этим шприцем и обратитесь в отдел обслуживания клиентов Ultradent для его замены.
8. Используйте только рекомендованные насадки. Не используйте повторно во избежание перекрестного заражения.
9. Во избежание перекрестного загрязнения, используйте одноразовые колпачки для шприца, а также протирайте шприц между применениями дезинфицирующим средством. Если не следовать данным инструкциям то, шприцы следует рассматривать как одноразовые.
10. Храните в недоступном для детей месте.
11. Беременные или кормящие женщины или пациенты с серьезными проблемами со здоровьем не должны отбеливать зубы. Проконсультируйтесь с их лечащим врачом до начала лечения.
12. При работе с этим изделием надевайте защитные перчатки.
13. Перед утилизацией шприца промойте его водой, набрав и слив воду в шприц. Повторите процедуру несколько раз перед утилизацией. Убедитесь, что все используемые марли промыты водой.
14. Не используйте препараты для лечения пациентов с повышенной чувствительностью к акрилатам, пероксидам, гликолям и другим композитам. При появлении аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
15. При нанесении защитного барьера на весь зубной ряд проведите светоотверждение композита стандартным способом в течение 20 секунд сканирующим движением, удерживая линзу на расстоянии приблизительно 1 см от барьера и тканей. При нанесении защитного барьера на меньшее количество зубов выполняйте сканирующие движения вдоль барьера, затрачивая приблизительно от 3 до 5 секунд на каждый зуб. Используя стоматологический инструмент, осторожно проверьте, полностью ли отвержден композит.
16. При появлении пузырьков вдоль границы полоски защитного барьера OpalDam после нанесения Opalescence Boost для клинического использования, смойте гель, прополоските и проверьте на герметичность. Слегка подсушите участок и нанесите защитный барьер OpalDam повторно.
17. Все чувствительные участки открытого дентина необходимо защитить.
18. Для пациентов с известной чувствительностью зубов рекомендуется предварительная и послеоперационная обработка с помощью десенсибилизирующего геля UltraEZ, рекомендуется использовать зубную пасту для удаления чувствительности Opalescence и/или Enamelast™ со фторидом. В зависимости от степени чувствительности доступны другие варианты лечения.
19. Могут присутствовать участки гипокальцинации, не обнаруживаемые при клиническом осмотре, отбеливание которых будет происходить быстрее, чем прилежащей эмали. Оттенок таких участков выровняется при продолжении пациентом процедур отбеливания.
20. Все стоматологические материалы Ultradent, поставляемые в шприцах, не должны вводиться под кожу.
21. Не подвергайте прямому воздействию высоких температур и (или) солнечного света.
22. Отбеливающий гель Opalescence Boost для клинического использования следует использовать в течение 10 дней после смешивания. Между использованиями храните в холодильнике.
23. Утилизируйте наконечники и шприцы, как описано выше, в соответствии с местными правилами.

Opalescence™ Boost™ 40% TR
Diş Beyazlatma Sistemi

Tanım:
Opalescence Boost %40, %40 hidrojen peroksit içerikli, ofis tipi tıbbi beyazlatıcı jeldir. 2 hazneli jel karıştırma şırıngası her uygulamada maksimum güç ve aktivatör dozunun hassas biçimde ayarlanmasını sağlar. Haznenin birinde benzersiz bir kimyasal aktivatör, %1,1 sodyum florür ve %3 potasyum nitrat bulunur. Bu içerik, ikinci haznede bulunan hidrojen peroksit ile karıştırılır. Son hidrojen peroksit konsantrasyonu %40'dır.

Kullanım Endikasyonları:
Opalescence Boost %40 beyazlatıcı, sadece ofis tipi tıbbi kullanım içindir. Bir veya birden fazla dişin beyazlatılması amacıyla diş hekimi tarafından uygulanır. Opalescence Boost, ofis tipi intrakoronal beyazlatma da dâhil olmak üzere nonvital dişlerde de kullanılır.
Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcı, hastalık, travma veya iyatrojenik hasar, konjenital, sistemik, metabolik veya farmakolojik etkiler gibi yatkınlık yaratan faktörlere bağlı olarak iç kaynaklı renk değişimi görülen, koyu dişlerin (kronlara, kaplamalara vs. kıyasla) tedavisine yönelik alternatif, konservatif bir yöntemdir. Bu faktörler arasında yükselmiş bilirubin seviyeleri, tetrasiklin ve erişkin minosiklin lekeleri, porfiri, eritroblastozis fetalis ve diş gelişimi süresince yüksek florür alımı sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ön İşlemler:
1. Beyazlatma randevusundan yaklaşık iki hafta önce dişleri temizleyip cilalayın.
2. Başlangıç rengini belirleyip kaydedin. Başlangıcın belgelenmesi için endike ise fotoğraf çekin.
3. Karıştırmadan önce Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcıyı oda sıcaklığına getirin.
4. UYARI: Bu ürün karıştırılırken ve uygulanırken hasta, klinisyen ve asistan koruyucu gözlük ve eldiven takmalıdır.

Kullanım Talimatları:
Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma
1. Şırıngaların sıkıca takıldığından emin olun.
2. Küçük şeffaf pistonu, ortadaki küçük şeffaf şırıngaya bastırarak iç zarı yırtın ve beyazlatıcı ile aktivatörü birleştirin.
3. Kırmızı şırınganın pistonunu bastırarak tüm içeriği şeffaf şırıngaya itin.
4. Şeffaf şırınganın pistonunu kırmızı şırıngaya sonuna kadar geri itin.
5. Şırınga gövdelerini baş parmağınızla sürekli olarak ileri geri iterek aktivatör ile beyazlatıcı jeli iyice karıştırın. En az 50 defa hızlı bir şekilde karıştırın (her tarafı 25 defa).
6. Karıştırılan jelin tamamını KIRMIZI şırıngaya itin.
7. Çevirerek iki şırıngayı çıkarın ve önerilen ucu (veya Black Mini™ uç) kırmızı şırıngaya sıkıca takın.

İzolasyon - OpalDam™ rezin bariyer (önerilen izolasyon):
1. Ultradent IsoBlock™ Isırma Bloğunu ve kendinden destekli dudak/yanak ekartörlerini yerleştirin.
2. OpalDam rezin bariyerden Luer kilit kapağı çıkarıp sıkıca bir veya Black Mini™ uç takın.
3. Ağız içi uygulamadan önce akışı doğrulayın.
4. Dişleri ve diş etlerini iyice yıkayıp kurutun.
5. Gingival marjin boyunca, mineyi yaklaşık 0,5 mm kaplayacak şekilde, çizgi halinde kesintisiz bir OpalDam rezin bariyer tabakası uygulayın. Beyazlatılan dişe en distal dişten bir sonraki dişte çizgiyi başlayıp bitirin.
6. Bariyer 4–6 mm uzunluğunda, 1,5–2,0 mm kalınlığında olana kadar uygulamaya devam edin.
7. Lingual dokudaki açık embrasürlere rezin uygulayarak açık papillayı tamamen örtüp kapatın.
8. Ağız aynasını kullanarak dişin uzun ekseninde alt dokuyu açıkta bırakan boşluk veya küçük açıklıklar olup olmadığını kontrol edin, varsa rezini yeniden uygulayın.
9. Tarama hareketi ile her arkı 20 saniye ışıkla polimerize edin. Alet kullanarak rezin polimerizasyonunu dikkatlice kontrol edin.

İzolasyon – İzolasyon Lastiği
1. Ligate edilen klempleri bilateral olarak, beyazlatılacak dişin bir diş distaline yerleştirerek izolasyon lastiği uygulayın.
2. İzolasyon lastiğini çerçeveye takmadan önce lastiğin altındaki gingival marjine izolasyon lastiği örtücüyü çizgi şeklinde uygulayın.
3. Lastiği çerçeveye takın ve izolasyon lastiğini gingival sınırda ters çevirin. Optimum izolasyon sağlandığını kontrol edin.

Opalescence Boost ofis tipi beyazlatmanın uygulanması
1. Ağız içi uygulamadan önce tüm şırıngaların aktığını gazlı bez veya karıştırma pedinde doğrulayın. Dirençle karşılaşırsanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin. Sadece önerilen uçları kullanın.
NOT: Direnç devam ederse şırıngayı KULLANMAYIN ve ürün değişimi için Ultradent müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.
2. Dişin labial yüzeyini temizlemek için 0,5–1,0 mm kalınlığında bir jel tabakası uygulayın.
3. İncelen veya yenilenmesi gereken alanları düzenli aralıklarla kontrol edip yeniden uygulayarak jeli 20 dakika dişin üzerinde bekletin.
4. Luer Vakum ve SST™ (Surgical Suction Tip) veya bir cerrahi aspirasyon ucu kullanarak jeli dişten aspire edin. Jelin sıçramasını önlemek için jeli aspire ederken su kullanmayın. Görünürde jel kalmadığında hafifçe yıkayıp hava ile kurutun. İzolasyon bariyerinin veya izolasyon lastiğinin yerinden oynamamasına dikkat edin.
5. Her uygulamadan sonra renk değişimini değerlendirin ve hasta hassasiyetini ve iritasyonunu gözleyin. İnatçı diş hassasiyeti oluşursa kullanmayı bırakın.
6. Yumuşak doku ve tükürük ile temas etmemesine özen gösterin. Ağız içi dokunun hidrojen peroksit jel ile temas etmesine bağlı olarak kimyasal irritasyon oluşursa ıslak gazlı bez kullanarak hemen dokudan jeli silin ve alanı iyice yıkayın. Doku 20–30 dakika içinde normale döner.
7. İstenen sonuçlara ulaşılamadıysa 2–5 arasındaki adımları en fazla iki sefer daha tekrar edin. Bir randevuda en fazla 3 kez uygulayın.
8. Daha fazla ofis tipi beyazlatma isteniyorsa ve önemli bir hassasiyet gözlenmediyse tedaviyi tekrarlamak üzere hastanın isteğine göre tekrar randevu verin. Hassasiyet oluştuysa hassasiyet hafiflediğinde tedaviyi tekrar edin.

Temizleme
1. Luer Vakum ve SST™ (Surgical Suction Tip) veya bir cerrahi aspirasyon ucu kullanarak jeli dişten aspire edin, daha sonra hava/su spreyi ve yüksek hacimli aspirasyon kullanarak dişi iyice yıkayın.
2. Dental alet kullanarak ucu nazikçe OpalDam rezin bariyerin altına kaydırıp bariyeri kaldırın. İnterproksimal kalıntı olup olmadığını kontrol edip varsa uzaklaştırın.
3. İzolasyon lastiği kullandıysanız Temizleme başlığındaki 1. adımı takip edin ve klempleri, lastiği ve çerçeveyi çıkarın.
4. İzolasyon lastiği örtücüyü spatula, yumuşak bir diş fırçası, diş ipi, aspirasyon ve yoğun hava/su spreyi ile uzaklaştırın.

NOTLAR:
• Beyazlatma işlemi, doğal dişin renginin renk değişimine uğramamış diğer dişlerin veya daha önce yapılan restorasyonların rengine döndürülmesi amacıyla kullanılır.
• Beyazlatma işleminin etkisi, işlemden sonra 24–48 saat kadar sürebilir, dolayısıyla bu süre zarfında beyazlatmada küçük bir artış görülebilir.
• Bu talimatlar kullanılarak ve beyazlatıcı sadece renk değişiminin olduğu alanlara uygulanarak tek bir diş veya birkaç diş birlikte beyazlatılabilir.
• İşlem sonrası hassasiyet için, işlemden hemen sonra ve hassasiyet geçene kadar günde 15 dakika ila 1 saat süreyle UltraEZ™ hassasiyet giderici jel gibi potasyum nitrat ürünleri kullanın.
• Beyazlatma işleminden önce minenin asitle aşındırılması veya profi patı ile cilalama önerilmez; bu işlemler beyazlatma işleminin etkisini güçlendirmediği gibi hassasiyete sebep olabilir.

Endodontik Tedavi Uygulanmış Dişler:
• Non-vital dişler, beyazlatma hızını/etkinliğini hızlandırmak için hem içeriden hem dışarıdan beyazlatılabilir.
1. Koronal pulpa odasından ve sağlıklı gingivanın 2–3 mm altından restoratif ve kanal sealing materyalini tamamen uzaklaştırın. Endodontik tedavi görmüş kanalı kapatmak için 2 mm kalınlığında konvansiyonel cam iyonomer veya UltraCem™ gibi bir rezin modifiye cam iyonomer yerleştirin.
2. Yukarıdaki 1–6 arasındaki adımlarda açıklanan "Karıştırma" talimatlarını takip edin.
3. Black mini uç takarak ağız içi uygulamadan önce akışı doğrulayın.
4. Yukarıdaki "İzolasyon" talimatlarını takip ederek dişin hem labial hem de lingual taraflarını izole edin.
5. Erişim açıklığına, labiale ve istenirse lingual yüzeye uygulayın.
6. Jeli 20 dakika dişte bırakın.
7. Luer Vakum ve SST™ (Surgical Suction Tip) veya bir cerrahi aspirasyon ucu kullanarak jeli erişim açıklığından ve dişten aspire edin. Jelin sıçramasını önlemek için jeli aspire ederken su kullanmayın.
8. Görünürde jel kalmadığında hafifçe yıkayıp hava ile kurutun. İzolasyon bariyerinin veya izolasyon lastiğinin yerinden oynamamasına dikkat edin.
9. Renk değişimini değerlendirin.
10. Gerekirse 7–11 arasındaki adımları tekrar edin.
11. Gingival bariyerleri çıkarmak için "Temizleme" talimatlarını takip edin.
12. Erişim açıklığını UltraTemp™ Normal gibi öjenolsüz ve rezinsiz bir geçici restoratif ile örtün.

NOTLAR:
• Ek beyazlatma gerekirse yeniden randevu vererek yukarıdaki Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma işlemini tekrar edin veya Opalescence Endo beyazlatmayı kullanın.
• Beyazlatma işleminin etkisi, işlemden sonra 24–48 saat kadar sürebilir, dolayısıyla bu süre zarfında beyazlatmada küçük bir artış görülebilir.
• Yıllar içerisinde tedavi etkisinin gerilemesi beklenir ve ortalama 3–5 yılda bir yeniden beyazlatma tavsiye edilir.

Önlemler ve Uyarılar:
1. Bu ürün kullanılmadan gingiva ve ağız sağlığı kontrol edilmelidir.
2. Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma karıştırılırken ve uygulanırken klinisyen, asistan ve hasta yandan kalkanlı koruyucu gözlük takmalıdır.
3. Restoratif materyaller beyazlamayacağı için, dişlerin estetik restorasyonlardan önce beyazlatılması tavsiye edilir.
4. Beyazlatma malzemeleri bonding ajanlara müdahale ettiğinden, adheziv restorasyonları yerleştirmeden önce beyazlatma işlemlerinin ardından 7-10 gün bekleyin.
5. Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve bütün talimatları dikkatle okuyun ve anlayın.
6. Şırıngaları karıştırmadan önce oda sıcaklığına getirin.
7. Ağız içine uygulamadan önce tüm şırıngaların akışını doğrulayın. Dirençle karşılaşırsanız ucu değiştirin ve yeniden kontrol edin. Direnç devam ederse şırıngayı KULLANMAYIN ve ürün değişimi için Ultradent Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.
8. Sadece önerilen uçları kullanın. Çapraz kontaminasyonu önlemek için uçları yeniden kullanmayın.
9. Çapraz kontaminasyonu önlemek için, tek kullanımlık bir şırınga kapağı kullanın, kapağı kapatın ve şırıngayı her kullanımdan önce ve sonra orta düzeyli bir dezenfektan ile silin. Bu önlemler alınmazsa şırıngalar tek kullanımlık kabul edilmelidir.
10. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
11. Hamile veya emziren kadınlarda ve ciddi sağlık sorunları olan hastalarda beyazlatma işlemi yapılmamalıdır. Tedaviden önce aile hekimlerinden konsültasyon alın.
12. Bu ürün ile temas ederken koruyucu eldiven takılmalıdır.
13. Şırıngaları bertaraf etmeden önce şırıngalara su aspire edin ve sıvıyı atık su borusuna boşaltın. Şırıngayı bertaraf etmeden önce bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Kullanılan gazlı bezleri mutlaka suyla yıkayın.
14. Peroksit, glikol, akrilat veya diğer rezinlere karşı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanmayın. Alerjik reaksiyon, dermatit veya deri döküntüsü oluşursa bir hekime danışın.
15. Tam ark korunacaksa merceği bariyer ve dokudan yaklaşık 1 cm uzaklıkta tutarak rezin bariyeri standart modda tarama hareketi ile 20 saniye ışıkla polimerize edin. Daha az sayıdaki dişe komşu doku korunacaksa bariyeri her diş için yaklaşık 3–5 saniye tarayın. Dental alet kullanarak rezinin tam olarak polimerize olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
16. Opalescence Boost ofis tipi beyazlatma uygulamasının ardından OpalDam rezin bariyer marjini boyunca kabarcık oluşumu gözlerseniz jeli aspire edin, yıkayın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Alanı kurutun ve OpalDam rezin bariyeri alanı tekrar uygulayın.
17. Açığa çıkan dentinin olduğu hassasiyet alanlarını kapatın.
18. Bilinen diş hassasiyeti olan hastalarda tedavi öncesinde ve sonrasında UltraEZ hassasiyet giderici jel, Opalescence hassasiyet giderici diş macunu ve/veya Enamelast™ flor verniği önerilir. Hassasiyetin şiddetine bağlı olarak diğer tedavi seçenekleri de uygulanabilir.
19. Klinik olarak görünür olmasa da hipokalsifikasyon alanları mevcut olabilir. Bu alanlar komşu mineden daha hızlı beyazlaşır. Beyazlatma işlemi devam ettikçe bu alanlar uyumlu renge kavuşur.
20. Ultradent şırınga ile uygulanan dental materyaller kesinlikle enjekte edilmemelidir.
21. Doğrudan ısı ve/veya güneş ışığına maruz bırakmayın.
22. Opalescence Boost ofis tipi beyazlatıcı karıştırıldıktan sonra 10 gün içinde kullanılmalıdır. Kullanmadığınızda soğutucuda saklayın.
23. Uçları ve şırıngaları yukarıdaki talimatlarda anlatıldığı gibi, yerel talimatlar uyarınca bertaraf edin.

EN - Use by date
DE - Verfallsdatum
FR - Date de péremption
NL - Uiterste gebruiksdatum
IT - Utilizzare entro
ES - Usar antes de
PT - Usar até a data
SV - Använd före datum
DA - Udløbsdato
FI - Viimeinen käyttöajankohta
EL - Ημερομηνία λήξης
NO - Bruk før dato
PL - Data ważności
CS - Použijte do
RU - Использовать до
TR - Son kullanma tarihi

EN - See Instructions
DE - Siehe Anleitung
FR - Cf. instructions
NL - Zie gebruiksaanwijzing
IT - Vedere le istruzioni
ES - Vea las Instrucciones
PT - Veja as instruções
SV - Se anvisningar
DA - Se brugsanvisningen
FI - Lue käyttöohjeet
EL - Δείτε τις οδηγίες
NO - Se instruksjoner
PL - Patrz: instrukcje
CS - Viz pokyny
RU - См. инструкцию
TR - Talimatlara bakın

EN - Keep out of reach of children
DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
FR - Tenir hors de la portée des enfants
NL - Buiten bereik van kinderen houden
IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini
ES - Mantenga alejado del alcance de los niños
PT - Mantenha o produto fora do alcance de crianças
SV - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn
DA - Opbevares utilgængeligt for børn
FI - Pidä poissa lasten ulottuvilta
EL - Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά
NO - Holdes utilgjengelig for barn
PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
CS - Ukládejte mimo dosah dětí
RU - Хранить в недоступном для детей месте
TR - Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin

Ultradent™ Luer Vacuum Adapters

IsoBlock™ Bite Blocks

EN - Delivery Tips
DE - Injektionsnadeln
FR - Embouts d'application
NL - Applicatie-spuitmonden
IT - Puntali d'applicazione
ES - Puntas de suministro
PT - Pontas de aplicação
SV - Sprutspetsar
DA - Leveringsspidser
FI - Annostelupäät
EL - Συμβουλές παράδοσης
NO - Leveringstips
PL - Końcówki do nakładania
CS - Rady pro doručení
RU - Насадки-дозаторы
TR - Uygulama Uçları

LOT

EN - Lot Number
DE - Chargennummer
FR - Numéro du lot
NL - Batchnummer
IT - Numero del lotto
ES - Número de Lote
PT - Número do lote
SV - Satsnummer
DA - Lotnummer
FI - Eränumero
EL - Αριθμός παρτίδας
NO - Varenummer
PL - Numer serii
CS - Číslo šarže
RU - Номер партии
TR - Lot Numarası

EN - Do not re-use to avoid cross contamination
DE - Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen
FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada
PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
SV - För undvikande av korskontamination, återanvänd inte
DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
FI - Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi
EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση
NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning
PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia
CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci
RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения
TR - Çapraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın

EN - Recycle
DE - Recyclen
FR - Recycler
NL - Recyclen
IT - Riciclare
ES - Recicle
PT - Reciclável
SV - Återvinn
DA - Genbrug
FI - Kierrätä
EL - Ανακυκλώστε το
NO - Resirkuler
PL - Oddać do recyklingu
CS - Recyklujte
RU - Утилизировать
TR - Geri dönüştürün

EN - Manufacturer
DE - Hersteller
FR - Fabricant
NL - Fabrikant
IT - Fabbricante
ES - Fabricante
PT - Fabricante
SV - Tillverkare
DA - Producent
FI - Valmistaja
EL - Κατασκευαστής
NO - Produsent
PL - Producent
CS - Výrobce
RU - Производитель
TR - Üretici

EN - Destroy after use
DE - Nach Gebrauch vernichten
FR - Détruire après utilisation
NL - Na gebruik vernietigen
IT - Distruggere dopo l'uso
ES - Destrúyalo después de usarlo
PT - Destruir após usar
SV - Förstöres efter användning
DA - Destruér efter brug
FI - Hävitä käytön jälkeen
EL - Καταστρέψτε το μετά τη χρήση
NO - Kasseres etter bruk
PL - Po użyciu zniszczyć
CS - Po použití zlikvidujte
RU - После использования уничтожить
TR - Kullandıktan sonra imha edin

EN - 1.2ml OpalDam™ light cured resin barrier
DE - 1.2ml OpalDam™ lichtgehärtete Kunstharzbarriere
FR - 1.2ml OpalDam™ digue en résine photopolymérisante
NL - 1.2ml OpalDam™ lichthardende kunstharsdam
IT - 1.2ml OpalDam™ Barriera in resina fotopolimerizzabile
ES - 1.2ml OpalDam™ barrera de resina de fotocurado
PT - 1.2ml OpalDam™ barreira de resina fotopolimerizável
SV - 1.2ml OpalDam™ ljushärdad hartsbarriär
DA - 1.2ml OpalDam™ lyshærdet harpiksbarriere
FI - 1.2ml OpalDam™ valokovetettava hartsieste
EL - 1.2ml OpalDam™ Φωτο επεξεργασία ορίου ρητίνης
NO - 1.2ml OpalDam™ lysherdet harpiksbarriere
PL - 1.2ml OpalDam™ światłoutwardzalna żywica ochronna
CS - 1.2ml OpalDam™ světlem tvrzená pryskyřičná izolace
RU - 1.2ml OpalDam™ Светоотверждаемый материал для защиты десны
TR - 1.2ml OpalDam™ ışıkla polimerize olan rezin bariyer

EN - For professional use only
DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige
FR - Destiné à un usage professionnel uniquement
NL - Alleen voor professioneel gebruik
IT - Esclusivamente ad uso professionale
ES - Sólo para uso profesional
PT - Apenas para uso profissional
SV - Enbart för yrkesmässig användning
DA - Kun til professionel brug
FI - Vain ammattikäyttöön
EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο
NO - Kun for profesjonell bruk
PL - Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
CS - Pouze pro odborné použití
RU - Только для профессионального применения
TR - Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir

EN - 1.2ml Opalescence Boost In-Office Whitening
DE - 1.2ml Opalescence Boost Zahnweißung in der Praxis
FR - 1.2ml Opalescence Boost Produit de blanchiment en cabinet
NL - 1.2ml Opalescence Boost Tandartsbleekbehandeling
IT - 1.2ml Opalescence Boost Sbiancamento ambulatoriale
ES - 1.2ml Opalescence Boost Blanqueamiento en clínica
PT - 1.2ml Opalescence Boost Branqueamento em consultório
SV - 1.2ml Opalescence Boost Blekning på tandläkarmottagning
DA - 1.2ml Opalescence Boost Blegning i klinikken
FI - 1.2ml Opalescence Boost Vastaanotolla tehtävä valkaisu
EL - 1.2ml Opalescence Boost Λεύκανση στο ιατρείο
NO - 1.2ml Opalescence Boost Klinikkbleking
PL - 1.2ml Opalescence Boost Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym
CS - 1.2ml Opalescence Boost Bělení v ordinaci
RU - 1.2ml Opalescence Boost Отбеливание для клинического использования
TR - 1.2ml Opalescence Boost Ofis Tipi Beyazlatma

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.



X026 = LOT
X026 = MM
X026 = YYYY

EN - SST™ Tips (Surgical Suction Tips)
DE - SST™ Tips (Chirurgische Absaugspitzen)
FR - SST™ Tips (Embouts d'aspiration chirurgicaux)
NL - SST™ Tips (Chirurgische zuig-spuitmonden)
IT - SST™ Tips (Puntali d'aspirazione chirurgica)
ES - SST™ Tips (Puntas quirúrgicas de succión)
PT - SST™ Tips (Pontas de aspiração cirúrgica)
SV - SST™ Tips (Kirurgiska sugspetsar)
DA - SST™ Tips (Kirurgiske sugespidser)
FI - SST™ Tips (Kirurgiset imupäät)
EL - SST™ Tips (Συμβουλές χειρουργικής αναρρόφησης)
NO - SST™ Tips (Kirurgiske sugetips)
PL - SST™ Tips (Chirurgiczne końcówki ssące)
CS - SST™ Tips (Rady pro odsávání při chirurgickém zákroku)
RU - SST™ Tips (Наконечник для хирургических отсосов)
TR - SST™ Tips (Cerrahi Aspirasyon Uçları)

Opalescence™ Boost™ 40%
Tooth Whitening System

CE 0044

Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in the USA from U.S. and globally sourced materials

EC REP Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
1007244AR04 060220

2°C 36°F
27°C 81°F

EN - Patient and clinician must wear safety glasses when product is mixed and applied
DE - Patient und Arzt müssen Augenschutz tragen, während das Produkt angemischt und aufgetragen wird
FR - Le patient et le clinicien doivent porter des lunettes de protection lorsque le produit est mélangé et appliqué
NL - Patiënt en tandarts moeten een veiligheidsbril dragen tijdens het mengen en aanbrengen van het product
IT - Il paziente e il medico devono indossare occhiali protettivi durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto
ES - El paciente y el clínico deben utilizar gafas de protección cuando se mezcle y se aplique este producto
PT - O paciente e o clínico deverão utilizar óculos de proteção quando o produto for misturado e aplicado
SV - Patienten och klinikern måste använda skyddsglasögon då produkten blandas och appliceras
DA - Patient og tandlægepersonale skal anvende beskyttelsesbriller, når produktet blandes og appliceres
FI - Potilaan ja hammaslääkärin pitää käyttää silmiensuojaimia kun tuotetta sekoitetaan ja levitetään
EL - Ο ιατρός και ο ασθενής πρέπει να φοράνε γυαλιά προστασίας όταν αναμιγνύεται και απλώνεται το προϊόν
NO - Pasient og kliniker må bruke sikkerhetsbriller når produkt blandes og brukes
PL - W trakcie mieszania i nakładania produktu pacjent i lekarz muszą nosić okulary ochronne
CS - Při míchání a aplikaci produktu musí pacient i lékař nosit ochranné brýle
RU - Во время смешивания и нанесения препарата на пациенте и враче должны быть защитные очки
TR - Ürün karıştırılırken ve uygulanırken hasta ve klinisyen koruyucu gözlük takmalıdır

REF
EN - Catalog Number
DE - Katalognummer
FR - Numéro de référence
NL - Catalogusnummer
IT - Numero di catalogo
ES - Número de catálogo
PT - Número do catálogo
SV - Katalognummer
DA - Katalognummer
FI - Luettelonumero
EL - Αριθμός καταλόγου
NO - Katalognummer
PL - Numer katalogowy
CS - Katalogové číslo
RU - Номер по каталогу
TR - Katalog Numarası

EN - Keep away from heat/sunlight
DE - Von Hitze/Sonneneinstrahlung fernhalten
FR - Conserver à l'abri de la chaleur/lumière du soleil
NL - Uit de buurt van warmte/zonlicht bewaren
IT - Tenere lontano da fonti di calore/luce del sole
ES - Mantenga alejado del calor/luz solar
PT - Mantenha distância do calor/luz solar
SV - Skyddas från värme/solljus
DA - Må ikke udsættes for varme/sollys
FI - Suojattava kuumuudelta/auringonvalolta
EL - Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα/ηλιακό φως
NO - Hold borte fra varme/solskinn
PL - Przechowywać z dala od ciepła/promieniowania słonecznego
CS - Chraňte před teplem a sluncem
RU - Беречь от воздействия высоких температур и солнечного света
TR - Isıdan/güneş ışığından uzak tutun